

Encyklopädie

der gesammten

C h e m i e

abgefaßt

von

Friederich Hildebrandt

der Arzneikunde und Weltweisheit ord. öffentl. Lehrer
auf der Universität zu Erlangen, königl. Preuss. Hofrathe,
der Röm. kais. Akademie der Naturforscher, der kurfürstl.
Mainz. Akad. nützl. Wiss. zu Erfurt, der med. Soc. zu
Paris und zu Brüssel, der mineralog. Soc. zu Jena, der
Westphäl. oekon. Gesellschaft, der phys. Gesellschaft zu
Göttingen, Mitglieder, der kön. Grossbritt. Soc. der
Wiss. zu Göttingen Correspondenten.

Erster Theil. Theorie.

Zweites Heft.

E r l a n g e n,

in der Waltherischen Kunst - und Buchhandlung

1799.

Erziehungslehre

der Gegenwart

von C. H. E. M. i. e.

abgeliefert

von

Erziehungslehre

der Gegenwart und der Zukunft
von C. H. E. M. i. e.
abgeliefert

Erziehungslehre

abgeliefert

Erziehungslehre

der Gegenwart und der Zukunft

von

Erster Theil.

T h e o r i e.

Zweites Heft.

Erster Theil.

T h e o r e m

Zweiter Theil.

Neuntes Kapitel.

Die Salze überhaupt.

§. 239.

Salze (*Sales, Salia*) nennen wir alle diejenigen Materien, welche mit Wasser mischbar sind (§. 232).

Die bekannte, in der gemeinen Temperatur feste, Materie, welche wir im gemeinen Leben *Salz* nennen, hat Verwandtschaft zum Wasser, und wird von einer hinlänglichen Quantität desselben vollkommen aufgelöst. Eben diese Materie hat die Eigenschaft (*sapor*), auf unserer Zunge merklichen Geschmack (*gustus*) zu bewirken.

Dieselben Eigenschaften beobachten wir an vielen anderen, in der gemeinen Temperatur festen, Materien, wie dem Salpeter, dem Alaun, der Pottasche, — und pflegen daher alle feste Materien, welche im Wasser auflöslich sind, und Geschmack haben, *Salze*, jenes erstgenannte Salz aber zum Unterschiede *Kochsalz* zu nennen.

Da aber *eine* und *dieselbe* Materie, wenn sie schmelzbar ist, *fest* und *tropfbar*, wenn sie überdem flüchtig ist, *fest*, *tropfbar* und *Gas* seyn kann, je nachdem sie mehr oder weniger gebundene Wärme enthält, so ist es ohne Zweifel richtiger, nicht allein die festen Materien, welche mit

Wasser mischbar sind, sondern auch die tropfbaren und gasartigen, welche diese Eigenschaft haben, Salze zu nennen. Dieses ist denn auch schon dem Sprachgebrauche der meisten Chemiker gemäß, welche die Kohlensäure, das Ammoniak — zu den Salzen zählen. Man muß demnach nicht sagen: „welche *im Wasser auflöslich*,“ denn diese Bestimmung begreift nur die festen Salze: sondern allgemein: „welche *mit Wasser mischbar sind*.“ Will man aber bei dieser richtigen Ausdehnung des Begriffes folgerecht seyn, so muß man freilich auch das *Alkohol* zu den Salzen zählen, obwohl es gewöhnlich nicht geschieht.

Einige Chemiker (Gren *Handbuch der Chemie*. Halle 1794. I. §. 289) ziehen eine Gränzlinie zwischen Salzen und Erden, indem sie nur diejenigen Materien Salze nennen, welche, im festen Zustande sich befindend, in höchstens 200 Theilen siedenden Wassers auflöslich sind: sie schliessen daher den gebrannten Kalk, den Gyps — von den Salzen aus. Allein einmal ist bei dieser Bestimmung nur auf die festen Salze Rücksicht genommen, und zum andern ist diese Gränzlinie bloß willkührlich (wie denn vormals Bergman 500 Theile Wasser als das Quantum annahm, das zur Auflösung eines Salzes hinreichend sey) und der Natur nicht angemessen: ich behalte sie daher nicht bei, und halte mich an diejenige, welche der absolute Unterschied zwischen „mit Wasser *mischbar* seyn“ und „*nicht* mischbar seyn“ giebt.

Andere (Scherer *Nachtr. zu den Grundzügen der neuen chem. Theorie*. Jen. 1796. S. 541. Götting *Handb. der Chemie*. I. Jen. 1798. §. 487. Tromms-

dorff *Journal der Pharmacie*. V. 1. S. 43.) verstehen unter dem Namen *Salze* gar nur die Gemische, welche aus Säuren und Kalien, Säuren und Erden, Säuren und Metallen entstehen, also nur die Arten der Salze, welche wir *Mittelsalze*, *metallische Salze* — nennen werden. Allein warum wollen wir uns der Bequemlichkeit berauben, für *alle* mit Wasser mischbare Materien einen *gemeinen* Namen zu haben, und mit welchem wir die salzigen Luftarten von den nichtsalzigen, die salzigen Erden von den nichtsalzigen Erden unterscheiden können? Und die Pottasche, die Soda, — nicht Salze zu nennen, ist doch gar zu sehr dem eingewurzelten Sprachgebrauch zuwider.

Ich habe daher vormals in meinen Vorlesungen die Salze so definirt: „sie sind Stoffe, welche mit Wasser mischbar und für unsere Zunge schmeckbar sind.“ Allein der letzte Charakter scheint mir nicht hinlänglich statthaft zu seyn, weil er bloß von unserer Empfindung der Salze hergenommen ist, bei der es, um schwache Schmeckbarkeit wahrzunehmen, auf die grössere und geringere Empfindlichkeit des Organs ankommt, so daß ein sehr schwach schmeckendes Salz nach diesem Charakter von *einem* Menschen, der eine empfindliche Zunge hätte, für ein Salz angenommen werden könnte, und von einem *anderen*, dessen Zunge minder empfindlich wäre, nicht.

Aus diesem Grunde habe ich hier nur den einzigen Charakter der Salze beibehalten: *mit Wasser mischbar seyn*: nach welcher Bestimmung denn freilich auch das reine *Gummi*, und der thierische *Leim* den Salzen beizuzählen sind.

Ob und wie Erden von Salzen zu unterscheiden seyn, davon siehe unten im Kap. von den *Erden*.

§. 240.

Die meisten Salze äußern auf alle empfindliche und reizbare Theile des lebendigen thierischen Körpers merkliche Wirkung. In den eigentlich sogenannten reizbaren Theilen bewirken sie Zusammenziehung, in den empfindlichen Empfindung, in den Zungennerven insbesondere (subjectiven) *Geschmack* (*gustus*). Man nennt diese Eigenschaft derselben ihre *Schärfe* (*acrimonia*), wegen der Aehnlichkeit mit der Wirksamkeit eigentlicher, mechanisch wirkender, Schärfen; und in so fern sie Gustus bewirkt, auch (objectiven) *Geschmack* (*sapor*). Bei einigen Salzen ist diese Schärfe sehr gelinde, bei anderen sehr stark: es giebt hier viele verschiedene *Stufen* (*gradus*). Auch ist diese Schärfe von mannigfaltig verschiedener *Art* (*indoles*), wie vorzüglich bei dem Geschmacke beobachtet wird. Beides hängt von der verschiedenen Mischung der Salze, nämlich der Qualität und dem Verhältnisse ihrer Grundstoffe ab.

Man bedenke nur die mannigfaltige Verschiedenheit des *Geschmacks* der sauren, kalischen, Mittelsalze, metallischen Salze — dann die verschiede-

nen Wirkungen im Darmkanal und anderen Organen: Erbrechen, Diarrhoe, Schweiß, Speichelfluss — Hemmung solcher Ausleerungen — u. s. w.

§. 241.

Wahrscheinlich besteht jene Wirkung der Salze (§. 240) in einem chemischen Processe, bei welchem die thierische Faser aus dem Salze einen Stoff empfängt, oder einen an ihn verliert. Doch geschieht das bei der Wirkung vieler Salze nur in so kleiner Quantität, daß das Wesentliche der Mischung der lebenden thierischen Faser, und mithin ihr lebender Zustand bleibt. Einige Salze aber sind ätzend (*caustica*) für die festen Theile der organischen Körper, d. h. sie zerstören die Mischung, und mit dieser auch die Form und selbst das Leben derselben, entweder dadurch, daß sie dieselben auflösen, oder dadurch, daß sie ihnen einen Stoff in so großer Quantität entziehen oder geben, daß ihre Mischung wesentlich verändert, mithin auch das von dieser Mischung abhängende Leben derselben getilgt wird. Eben diese Salze reizen die lebendige thierische Faser heftig, und bewirken, so lange sie dieselbe noch nicht getödtet haben, heftige Zusammenziehungen und Schmerzen. Es hängt aber, ob ein Salz die lebendige thie-

rische Faſer nur reize oder tödte, nicht allein von der Art des Salzes, ſondern auch von der Quantität deſſelben und davon ab, ob es weniger oder mehr mit Waſſer geſchwächt iſt.

So iſt ein Gran trocknes oder mit wenig Waſſer befeuchtetes Kali ätzend; hingegen nicht eine Auflöſung eines Granes davon in einem Pfunde Waſſer.

§. 242.

Einige Salze ſind *feuerbeſtändiger* (§. 135. 134), ſo daſs ſie einen hohen Grad von Glühhitze aushalten, ohne verflüchtigt zu werden, andere ſind *flüchtiger*, einige ſo flüchtig, daſs ſie auch in den höchſten uns bekannten Graden der Kälte immer *Gas* ſind.

§. 243.

Einige Salze können im *feſten* Zuſtande ſeyn. Alle dieſe ſind aber *ſchmelzbar* (§. 118 fgg.), wenn ſie nur nicht ſo flüchtig ſind, um durch Wirkung der Hitze ſchon zu Dunſt oder Gas zu werden, ehe ſie ſchmelzen können. Doch erfordern die meiſten (vielleicht alle dieſe) Salze, an ſich *ſelbſt*, ohne Zuthun ihres Kryſtallifationswaſſers, zum Schmelzen die Glühhitze. Hingegen ſchmelzen ſie ſchon in geringer Temperatur, wenn die nöthige Quantität von Waſſer auf ſie wirkt:

sie mischen sich dann mit dem Wasser und werden mit ihm tropfbar; man sagt, sie werden vom Wasser aufgelöst.

§. 244.

Jedes feste Salz bedarf bei einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Quantität Wasser, um tropfbar flüssig zu werden; einige bedürfen mehr, andere weniger, und diese Quantität ist sehr verschieden: es giebt Salze, die kaum so viel Wasser dazu nöthig haben, als ihre eigene Quantität beträgt, und Salze, welche eine tausendfache und grössere Quantität Wasser erfordern. Bei den meisten, wenn nicht bei allen, hängt dieser Unterschied aber auch von dem Grade der *Temperatur* des auflösenden Wassers ab: wärmeres Wasser löset von ihnen mehr, kälteres weniger auf, sie bedürfen also vom wärmeren Wasser weniger, vom kälteren mehr, um aufgelöst zu werden. Bei einigen Salzen ist dieser Unterschied gross, bei anderen nur klein.

Bei dem Salpeter ist er z. B. sehr gross, da 1 Pfund Salpeter von siedendem Wasser nur 1 Pfund, von kaltem (50° Fahr.) 7 Pfund zur Auflösung nöthig hat; beym Kochsalz hingegen klein, da 1 Pfund desselben $2\frac{1}{7}$ von siedendem, und $2\frac{1}{7}$ von kaltem (50° Fahr.) Wasser zur Auflösung erfordert.

§. 245.

Alle *salzige Gasarten* werden vom tropfbaren Wasser *verschluckt*, d. h. die Materie dieser Gasarten verliert, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt, ihren Gaszustand, und wird mit dem Wasser tropfbar. Von diesen Salzen kann aber das Wasser desto mehr enthalten, je kälter es ist, weil sie flüchtiger sind, als Wasser, und daher aus dem Wasser als Gas entweichen, desto mehr, je mehr es erwärmt wird.

§. 245. b.

Wenn *Eis* und ein *salziges Gas* zusammenkommen, so wird das Eis tropfbar und verschluckt dann das Gas, so daß beide mit einander tropfbar werden *). Dabei entsteht Erwärmung, wenn mehr gebundene Wärme des Gas frei wird, als nöthig ist, um das Eis tropfbar zu machen.

*) Dies geschieht wenigstens bei dem Ammoniakgas, schwefelsauren Gas und salzsauren Gas.

§. 246.

Wasser mit Salz gemischt, heist eine *Lauge*. Eine Lauge heist *gesättigt*, wenn sie so viel Salz hält, als ihr Wasser bei ihrem Wärmegrade halten kann (§. 244), übrigens *stark* (*eingeengt, concentrirt*) oder *schwach*

(*verdünnt*,) je nachdem sie nach Verhältniß des Wassers mehr oder weniger Salz hält.

§. 247.

Wenn eine mit einem Salze, das für sich allein in der gemeinen Temperatur fest ist, gesättigte Lauge entweder etwas von ihrer freien Wärme verliert (*abgekühlt* wird), oder durch Verdunstung etwas von ihrem Wasser verliert (*abgedampft* wird,) so muß ein Theil ihres Salzes sich ausscheiden und *fest* werden. Hingegen aus einer Lauge, die mit einem Salze gesättigt ist, das ohne Wasser als Gas existirt, scheidet durch Erwärmung ein Theil des Salzes, nach Maafsgabe des Grades der Erwärmung, bei einigen derselben durch Sieden alles, als Gas sich aus.

§. 248.

Wenn Wasser aus einer Lauge verdunstet, so werden Salztheile mit verflüchtigt. Dies geschieht nicht blofs bei flüchtigen, sondern auch bei solchen Salzen, die an sich selbst feuerbeständig sind, nicht blofs in der Siedhitze, wo durch die heftige Bewegung auch tropfbare Theilchen der ganzen Lauge verspritzt werden können, sondern auch bei der Verdunstung in niedriger, ja in gemeiner Temperatur, selbst zur Winterszeit. Doch

geschieht es nicht sowohl bei dem Abdunsten in gesperrten, z. B. in Retorten, deren Hals in Wasser ragt, oder in eine Vorlage eingekittet ist, als bei dem in frei offenen Gefäßen; es scheint daher, daß die Wirkung der Atmosphäre auf die Laugen daran großen Antheil hat.

Man lasse z. B. ein offenes, oder auch mit Papier lose bedecktes, mit einer Salzlauge halb angefülltes Zuckerglas an freier Luft stehen, so vermindert sich nicht allein nach und nach das Wasser der Lauge, sondern es setzt sich auch festes Salz am obern Theile der innern Fläche des Gefäßes, oberhalb der tropfbaren Lauge, am obern Rande und wohl gar auf der äußern Fläche des Gefäßes, an.

§. 249.

Die meisten Salze nehmen, wenn sie aus dem flüssigen Zustande in den festen übergehen, eine bestimmte Gestalt an. Man sagt alsdann, daß sie sich *krySTALLISIREN* (§. 28): ein einzelner Salzkörper, der von Natur eine bestimmte Gestalt hat, heißt ein *SalzkrySTALL*. Diese KrySTALLISATION kann, da alle Salze schmelzbar (§. 243) und einige flüchtig (§. 242) sind, auf dem *TROCKNEN* Wege (d. h. ohne Wasser), da aber alle feste Salze im Wasser auflöslich sind, auch auf dem *NASSEN* Wege, d. h. mit Hülfe des Wassers, gesche-

hen. Auf dem trocknen Wege krySTALLISIRT sich ein Salz, entweder wenn es geschmolzen, oder wenn es Dunst oder Gas war, und dann hinlänglich erkaltet. Auf dem nassen Wege, wenn es in Wasser aufgelöst war, und in demselben durch Minderung des Wassers oder der Wärme fest wird (§. 247). Aber bei beiden Arten von KrySTALLISATION ist Ruhe nöthig: Bewegung während des Festwerdens hindert die Bildung regelmässiger KrySTALLE.

Oft wird ein SalzkrySTALL auch durch Druck gehindert, seine bestimmte Gestalt vollkommen anzunehmen. So geschieht das bei KrySTALLISATIONEN aus *Salzdunst*, bei Sublimationen, wenn starke Hitze denselben immerfort in den entferntesten (höchsten) Theil des Gefäßes treibt, so daß hier die festwerdenden Theile sehr zusammengedrängt werden und einander in der Annehmung der bestimmten Gestalt hinderlich sind. Ferner bei KrySTALLISATIONEN trockner *geschmolzener* Salze, wo die unteren KrySTALLE theils durch Widerstand des Bodens am Gefäße, theils durch das Gewicht der obern KrySTALLE gehindert werden. Und bei KrySTALLISATIONEN auf dem nassen Wege entstehen keine ordentliche KrySTALLE, wenn zu wenig Wasser bei dem Salze ist, wenn entweder durch Abdampfung zu viel Wasser weggeschafft, oder bei der Auflösung in siedendem Wasser zu wenig Wasser genommen worden, wo denn bei der Abkühlung die ganze Lauge zu einem, im ganzen festen, nur mit Wasser durchzogenen, Salz-

klumpen gerinnt, der die Gestalt des umgebenden Gefäßes, inwendig aber, weil ein entstehender Kry stall dem andern im Wege war, nur unvollkommene kry stallinische Structur hat. Auch werden auf dem nassen Wege die am Boden entstehenden Kry stalle durch den Gegendruck desselben und das Gewicht der über ihnen stehenden Kry stalle gehindert, vollkommen ausgebildet zu werden.

§. 249. b.

Die auf dem nassen Wege erfolgende Kry stallisation der Salze kann geschehen

- a) durch *Verminderung* der nöthigen *Quantität* des Wassers, nämlich durch *Verdunstung* eines Theiles desselben, so daß die übrig bleibende Quantität des Wassers nicht hinreichend ist, die Quantität des Salzes aufgelöst zu erhalten, folglich ein Theil desselben fest werden muß. Diese Verdunstung kann langsamer, in der gemeinen Temperatur, oder schneller, in erhöhter Temperatur geschehen.
- 2) Durch *Verminderung* der nöthigen Quantität der freien *Wärme* (oder *Abkühlung*), so daß die Quantität des Wassers, welche vorher in der höheren Temperatur hinreichte, nun in der niedrigeren nicht hinreicht, alles Salz aufgelöst zu erhalten, folg-

folglich ein Theil desselben fest werden muß (§. 244. 246).

Die Regeln zum künstlichen KrySTALLISIREN der Salze
s. unten im praktischen Theile.

§. 250.

Die auf dem nassen Wege entstandenen Salzkrystalle enthalten außer dem Salze selbst *KrySTALLISATIONSwasser*, das zwar nicht zum Wesen des Salzes, aber der Krystalle gehört. Es ist bei der gemeinen Temperatur in den SalzkrySTALLen im festen Zustande enthalten, wie das Salz selbst, heißt daher *KrySTALLISATIONeis*, ist aber durch die Mischung mit dem Salze gefrierbarer oder strengflüssiger worden, so daß es noch in der Wärme von 50°, 60°, 70° R. fest bleibt, da hingegen bloßes Eis schon in einer Wärme von 1°, 2°, R. tropfbar wird.

§. 251.

Wenn ein Salz, das viel KrySTALLISATIONSwasser hat, und zugleich leicht auflöslich ist, z. E. Natrum sulphuricum (Glaubersalz), über den Siedgrad des bloßen Wassers erhitzt wird, so schmilzt das ganze Salz, indem das KrySTALLISATIONeis tropfbar, und dann das Salz selbst in diesem aufgelöst wird. Dieses Schmelzen ist aber wohl zu unter-

scheiden, von dem Schmelzen des bloßen entwässerten Salzes, das erst in viel größerer Hitze geschieht, und wird zum Unterschiede das *Zergehen im Kry stallenwasser* genannt.

§. 252.

Wenn ein Salz, welches Kry stallisationswasser hält, und an sich selbst nicht zu flüchtig ist, über den Siedgrad des Wassers! erhitzt wird, so verdunstet das Kry stallenwasser, und bei fortgesetzter bis zum Glühen verstärkter Wirkung bleibt endlich das bloße entwässerte Salz zurück. Wenn das Salz viel Kry stallenwasser hält, so zergeht es bei dieser Erhitzung anfangs (§. 251); dann wird es, nach Verlust seines Kry stallenwassers, wieder fest, und schmilzt erst bei verstärkter Glühhitze.

Wenn man ein (auf dem nassen Wege) kry stallisiertes Salz hinlänglich und lange genug erhitzt hatte, so findet man nachher, daß es einen beträchtlichen Verlust am Gewicht erlitten hat. Daß dieser Verlust im Verluste des Kry stallisationswassers bestehe, sieht man, wenn das Salz in einer Retorte mit angelegter Vorlage erhitzt wurde, indem man die Wasserdünste in die letztere übergehen, und daselbst zu tropfbarem Wasser sich verdichten sieht.

§. 253.

Einige Salze verlieren ihr KrySTALLISATIONSWASSER nach und nach schon in gemeiner Temperatur, wenn sie der atmosphärischen Luft ausgesetzt sind, welche, je trockner und wärmer sie ist, desto mehr daselbe als Dunst anzuziehen scheint. Sie verlieren dabei ihre KrySTALLENGESTALT, und zerfallen nach und nach in Staub (*fatiscunt*), der um so viel leichter gegen das frische Salz ist, je größer die Quantität des KrySTALLENWASSERS war.

Dieses Zerfallen ist eine Art des *Verwitterns* (§. 185).

§. 254.

Andere Salze hingegen zerfließen (*deliquescent*) an der atmosphärischen Luft, indem sie Wasser aus ihr anziehen, so daß sie endlich vollkommen tropfbar werden. Es ist aber nicht bei allen Salzen wahrscheinlich, daß sie bloß durch Anziehung des als Dunst in der Luft enthaltenen Wassers zerfließen, weil sie 1) zu schnell zerfließen, als daß dieses bloß dadurch geschehen könnte, 2) eingesperrte atmosphärische Luft vermindern, wie man an dem Steigen des Wassers (oder Quecksilbers) sieht, mit dem dieselbe eingesperrt ist. Sie scheinen aus dem

Oxygene der Luft, und ihrem eignen Hydrogene, das alle diese so schnell zerfließenden Salze gewiss oder wahrscheinlich enthalten, Wasser zu erzeugen (§. 225).

Die Wirkung der höheren Temperatur wird vielleicht durch die Wirkung der anderen Stoffe des Salzes ersetzt.

§. 255.

Sowohl ein durch Glühhitze geschmolzenes, als ein durch geringere Hitze oder durch Verwitterung an der Luft seines Kry stallenwassers und dadurch seiner auf dem nassen Wege erlangten bestimmten Gestalt beraubtes Salz kann wieder im Wasser aufgelöst werden (§. 239. 243), und wenn die Lauge durch Abdampfen oder Abkühlen dahin gebracht wird, daß ein Theil des aufgelöseten Salzes sich ausscheiden muß (§. 249. b), so nimmt das sich ausscheidende Salz mit Annahme des nöthigen Kry stallenwassers (§. 250) seine bestimmte Gestalt wieder an.

§. 255. b.

Wenn ein festes durch Glühhitze (§. 252) oder Verwitterung (§. 253) seines Kry stallisationseises beraubtes Salz mit wenigem Wasser begossen wird, so entbindet sich *Wärme*, indem das Wasser vermöge seiner Anziehung zum Salze sich mit diesem vereinigt, zu Kry-

stallisationseis wird; dabei also die gebundene Wärme frei wird, vermöge deren dieses Wasser tropfbar war. Wenn des Wassers viel ist, so entbindet sich zwar auch Wärme, aber sie ist desto weniger merklich, je mehr des Wassers ist, weil sie sich dann desto mehr in dem tropfbar bleibenden Theile des Wassers vertheilt, und überdem dann Auflösung des Salzes im Wasser erfolgt, welches die Wärme wieder mindert.

Wenn hingegen ein festes Salz im Wasser aufgelöset wird, so entsteht *Kälte*, indem das Salz durch Anziehung zum Wasser tropfbar, dabei also so viel freie Wärme gebunden wird, als nöthig ist, um das feste Salz tropfbar zu machen. Wenn das Salz sein KrySTALLISATIONSEIS hat; so ist die Kälte ceteris paribus viel größer; wenn hingegen das Salz seines KrySTALLISATIONSEISES beraubt ist, so ist bei gleicher Quantität des eigentlichen Salzes die Kälte viel geringer, erstlich weil dann diejenige Bindung der Wärme fehlt, welche vom Tropfbarwerden des KrySTALLISATIONSEISES entsteht: zweitens, weil das Salz erst wieder einen Theil des Wassers zu KrySTALLISATIONSEIS anzieht, und dadurch Wärme frei wird.

Zehntes Kapitel.

Die Säuren.

§. 256.

Die Säuren (*Acida*) oder sauren Salze (*Salia acida*) sind Salze (§. 239), welche sich von anderen durch ihren sauren Geschmack unterscheiden. Auch haben sie alle die Charaktere, gewisse blaue Pflanzenfarben zu röthen, mit Kalien, kalischen Erden und Metallen sich zu mischen, den Schwefel aus dem Schwefelkali und das Oel aus der Seife zu scheiden, und den Eiweißstoff gerinnen zu machen.

Die Säuren röthen viele blaue, auch violette, Pflanzenfarben, den Saft oder die Tinctur der Petala des blauen *Veilchens* (*Viola odorata*), der *Kornblume* (*Centaurea Cyanus*), der *Aglei* (*Aquilegia vulgaris*), des *Hyacinthus botryoides* (Fuchs in *Crell's chem. Annalen*. 1793. II. S. 518.), der purpurfarbnen *Stockrose* (*Alcea purpurea* L.) *Brugnatelli* ebend. 1789. II. S. 518., der Blätter des *blauen Kohls* (*Brassica rubra*) (James Watt ebend. 1786. I. S. 146). — Vorzüglich leicht wird das blaue Pigment geröthet, welches unter dem Namen *Lakmus* bekannt ist: nämlich auch von der schwachen Kohlen Säure, und von anderen Säuren auch dann, wenn sie mit vielem

Wasser verdünnt sind. Am deutlichsten sieht man dieses, wenn weisse Papierstreifen mit Lakmustinctur blau gefärbt in Säuren getunkt werden. Von der Bereitung des Lakmus und dessen Gebrauch s. übrigens im prakt. Theile.

Die Röthung der blauen Pflanzenfarben erfolgt durch Wirkung der Säuren nur, wenn diese wässrig flüßig, oder im Gaszustande sind; nicht, wenn sie im festen und trocknen Zustande sind.

Bis izt kennen wir keine Stoffe, welche jene blauen Pflanzenfarben röthen und nicht Säuren sind; (wenn nicht der geschwefelte Wasserstoff (§. 201) eine Ausnahme macht? Allein er kann gar wohl eine unvollkommene Säure seyn, welche aus Schwefel, Hydrogene und Oxygene zusammengesetzt ist.)

§. 257.

Eine Säure besteht aus *Oxygene* und einem *säurefähigen Stoffe* (*materia oxydabilis* s. *acidificabilis*), d. h. einem solchen, welcher fähig ist, sich mit Oxygene zu mischen. Das Oxygene (§. 163) ist allen Säuren *gemein*, der saurefähige Stoff hingegen ist bei den verschiedenen Säuren mannigfaltig *verschieden*.

Dieser Satz ist nun freilich noch nicht durch vollständige Induction erwiesen. Nur von der *Schwefelsäure*, *Phosphorsäure*, *Kohlensäure* und *Salpetersäure* kennen wir den *Schwefelstoff*, den *Phosphorstoff*, den *Kohlenstoff*, den *Salpeterstoff*, von Pflanzensäuren den *Kohlenstoff* und *Wasser-*

stoff, von den *metallischen Säuren* und *Halbsäuren* die *Metalle* als säurefähige Grundstoffe. Allein die säurefähigen Grundstoffe der Salzsäure, Boraxsäure und Flusssäure sind uns noch unbekannt.

Es giebt auch Säuren, deren säurefähiger Stoff aus zweien *zusammengesetzt* ist, wie die Pflanzensäuren, bei deren Zerlegung sowohl Kohlenstoff als Wasserstoff gefunden wird. Vielleicht ist er in einigen aus mehreren *zusammengesetzt*.

S. Lavoisier über die *Beschaffenheit der Säuren* in den *Mem. de l'ac. des sc. de Paris*. 1778. p. 535. Ueb. in *f. phys. chem. Schr.* III. S. 212; gegen diese Lehre v. Crell über *Sauerstoff und Säure*, in *dess. chem. Ann.* 1795. I. S. 227.

§. 258.

Ein säurefähiger Stoff ist für sich nicht sauer, so wenig als das Oxygene (§. 163); er macht erst dann eine Säure, wenn er mit einer hinlänglichen Quantität Oxygene gemischt wird. Wenn ein solcher Stoff Oxygene aufnimmt, und mit sich mischt, so sagt man, er *säure* sich, oder *oxydire* sich; die Mischung nennt man *Säuerung* oder *Oxydation*, das entstehende Gemisch ein *Oxyd*. Es kann aber ein solcher Stoff vom Oxygene mehr oder weniger aufnehmen: darnach sind verschiedene Grade der Oxydation zu unterscheiden. Wenn er mit weniger Oxygene gemischt ist, als dazu gehört, eine

Säure auszumachen, so nennt man das Gemisch eine *Halbsäure*. Wenn er hingegen so viel Oxygene aufgenommen hat, daß das Gemisch jene (§. 256) genannten Eigenschaften zeigt, so nennt man dieses eine *Säure* (*Acidum*). Bei einigen säurefähigen Stoffen unterscheiden wir zweierlei Grade der Säure, die *unvollkommene* (*Acidum* *osum*, *Acide* *eux*) und die *vollkommene* (*Acidum* *icum*, *Acide* *ique*). Das *Acidum* *osum* enthält mehr Oxygene als die Halbsäure, aber weniger als das *Acidum* *icum*.

Halbsäuren nennt man diejenigen aus säurefähigen Stoffen und Oxygene bestehenden Gemische, welche so wenig Oxygene enthalten, daß sie noch gar nicht sauer schmecken, das Lakmus nicht röthen u. s. w. (§. 256). (Daß der Name *Halb* hier gebraucht wird, ist nicht so zu verstehen, als ob diese Gemische gerade halb so viel Oxygene enthielten, wie die Säuren, sondern so, wie im gemeinen Leben die Namen *halbklug*, *halbwahr*, — in der Mineralogie *halbhart* — genommen werden. Von dieser Art sind alle sonst sogenannten *Metallkalke*, der *Zucker* — auch das *Wasser* (§. 225)? Die Halbsäuren können, wenn sie mehr Oxygene aufnehmen, zu Säuren werden.

§. 259.

Nach der Erklärung der neuesten Phlogistiker, welche das Lavoisiersche System mit

der Hypothese vom Phlogiston vereinigen (§. 155. 166), enthalten alle säurefähige Stoffe, ausser ihrem eigenthümlichen Grundstoffe, *Phlogiston*: die Oxydation besteht nicht bloß in Annahme von Oxygene, sondern auch in Abgabe von Phlogiston; je mehr nun jener, der eigenthümliche Stoff, Oxygene anzieht, desto mehr giebt er Phlogiston ab. Ein Acidum *osum* hat noch *mehr* Phlogiston und *weniger* Oxygene; ein Acidum *icum* hat *weniger* (oder gar kein) Phlogiston, und mehr Oxygene.

§. 260.

Alle säurefähige Stoffe, welche schwarz oder farbigt sind, werden desto hellfarbiger, je mehr sie oxydirt werden, und im höchsten Grade der Oxydirung werden die meisten ganz *weiss*, so daß im allgemeinen das Gesetz Statt findet: *das Oxygene entfärbt*.

Der Wasserstoff ist an sich selbst, als Wasserstoffgas, nicht farbigt. Auch Schwefel und Phosphor sind weißgelb oder weiss. Aber die Kohle ist schwarz, und macht in Verbindung mit Wasserstoff, Schwefel, Phosphor, Metallen, mancherlei Farben; die durch Oxygene gemindert und endlich zerstört werden. Selbst die bloße Kohle giebt mit Oxygene gesättigt die farbenlose Kohlen Säure, welche nicht nur als Gas, sondern auch als fester Körper, (im reinen Kalkspathe,) und als tropfbarer (im reinen

Quellwasser) sich vollkommen farbenlos zeigt. Die unvollkommene Salpetersäure ist rothgelb, die vollkommene farbenlos. Im höchsten Grade der Oxydirung sind fast alle Oxyden Farbenlos.

§. 261.

Alle die verschiedenen Säuren, welche wir jetzt betrachten werden, unterscheiden sich von einander dadurch, dafs jede derselben mit einem Kali, einer Erde, einem Metalle, ein *anderes Gemisch* ausmacht, als jede andere Säure mit demselben Kali, derselben Erde, demselben Metalle zusammensetzt. Aber auch ausserdem sind sie durch gewisse Charaktere zu unterscheiden.

Wir betrachten, um Wiederholungen zu vermeiden, hier nur diejenigen Säuren, welche im Mineralreiche, (selbst oder als Grundstoffe der mineralischen Mittelsalze u. a. Mineralien) angetroffen werden, namentlich die *Kohlensäure*, *Schwefelsäure*, *Salpetersäure*, *Salzsäure*, *Flusssäure*, *Boraxsäure* und *Phosphorsäure*. Die übrigen Säuren werden füglich unten bei den vegetabilischen und thierischen Stoffen mitgenommen.

1.

Die Kohlensäure.

§. 262.

Die *Kohlensäure* oder *Kohlenstoffsäure* (*Acidum carbonicum*) ist eine äusserst flüch-

tige Säure, für sich allein, auch in den niedrigsten uns bekannten Temperaturen, *kohlen-saures Gas* (*Gas carbonicum*). Dieses Gas gehört zu denen, welche weder zur Unterhaltung des Athmens, noch zur Unterhaltung des Brennens tauglich sind. Es wird als ein salziges Gas vom Wasser verschluckt; röthet, als eine schwache Säure, ein wenig die Lakmustinctur, und hat einen schwachen angenehm säuerlichen Geschmack und Geruch. Es trübt das Kalkwasser, indem es den aufgelöseten Kalk desselben in kohlen-gefäueren Kalk verwandelt, und mithin im Wasser unauflöslich macht.

Es ist specifisch schwerer, als Lebensluft, also auch, als atmosphärische Luft. Ein Pariser Kubikzoll dieses Gas wiegt nach Lavoisier bei 10° R. und 28'' Barometerhöhe 0,68985. Seine spec. Schwere ist also größer, als die der atmosphärischen Luft, und verhält sich zu der der Lebensluft ungefähr wie 14:10. Daher macht das kohlen-saure Gas, über der Oberfläche solcher Körper, aus denen es sich entbunden hat, oft eine stehende Schicht aus, bleibt in offenen Gefäßen, Gruben, — stehen, ohne eingesperrt zu seyn.

Der Name: *fixe Luft* (*Aër fixus*), ist für das kohlen-saure Gas zu allgemein, und nicht bezeichnend genug. Eben so für diese Säure überhaupt der Name *Luftsäure* (*A. aëreum*), weil auch andere Säuren luftartig seyn können, wenn nicht dieser Name

darauf gehen soll, daß diese Säure als Gas in der Atmosphäre enthalten ist. Der Name *Kreidsäure* ist zu speciel, da nicht bloß die Kreide diese Säure enthält, und besser benennt man eine Säure nach ihrer säurefähigen Grundlage, wenn man anders diese Grundlage kennt.

§. 262. b.

Wasser kann dieses Gas verschlucken, d. h. die in dem Gas enthaltene Kohlensäure mit sich mischen, so daß dieselbe ihre Luftgestalt ablegt, und mit dem Wasser tropfbar, also *tropfbare Kohlensäure* wird. Je kälter das Wasser ist, desto mehr Kohlensäure kann es aufnehmen und enthalten; bei ungefähr 50° Fahrenheit, kann es eine Quantität kohlenfaures Gas verschlucken, dessen Volumen dem seinigen gleich ist; bei 48°, 46°, u. s. w. bis zu 32° mehr; je heißer es ist, desto weniger ist es fähig, Kohlensäure zu verschlucken, weil diese Säure zu flüchtig ist, um in höherer Temperatur ihre Luftgestalt abzulegen; und durch Erhitzung wird aus kohlengesäuertem Wasser seine Kohlensäure entbunden, weil sie zu flüchtig ist, um in höherer Temperatur mit dem Wasser tropfbar zu bleiben. Kochendes Wasser nimmt gar keine Kohlensäure auf, und durch Kochen wird alle Kohlensäure aus dem Was-

fer ausgetrieben. Hingegen ist bis zur Festigkeit erkaltetes Wasser auch unfähig, Kohlenfäure aufzunehmen, und durch Frost wird alle Kohlenfäure aus dem Wasser ausgetrieben. Auch in der mittleren Temperatur zeigt die Kohlenfäure keine so große Neigung zum Wasser, als das Acidum sulphurosum und das muriaticum; wenn sie, auch eingesperrt, nur über Wasser steht, so dauert es lange, ehe das Wasser sie anzieht; durch Schütteln mit Wasser in verschlossenen Gefäßen verbindet sie sich schneller damit. So geht auch, ohne sehr hohe Temperatur, aus Wasser, das Kohlenfäure hält, dieselbe leicht heraus, wenn es der freien atmosphärischen Luft mit großer Oberfläche ausgesetzt ist.

Das specifische Gewicht der mit Kohlenfäure gesättigten Wassers bei 36° Fahr. verhält sich zu der des Wassers, wie 1,0015:10000.

Von der Entweichung der Kohlenfäure aus dem Wasser beim Gefrieren desselben ist es, wenigstens zum Theile, abzuleiten, daß das Eis so viele Luftblasen enthält.

Wegen der Entweichung der Kohlenfäure aus dem Wasser, durch Berührung seiner Oberfläche mit der atmosphärischen Luft haben die Flußwasser viel weniger Kohlenfäure als die Quellwasser.

§. 263.

Die Kohlenfäure besteht aus *Kohlenstoffe* (§. 217. 214) und *Oxygene* (§. 163).

<i>Kohlenstoff</i>	72
<i>Oxygene</i>	28
	100

1) *Zusammensetzung.* Wenn man Kohle, die vorher in einem vom Zutritt der Luft ausgeschlossenen Gefäße ausgeglühet worden, (nemlich um vollkommene Kohle zu seyn, §. 219), anzündet, und in einem mit Lebensluft gefülltem Gefäße verbrennt, so entsteht kohlenfaures Gas. – Man kann dieses vom Kalkwasser verschlucken lassen, dadurch von der übrigen Lebensluft abscheiden, und seine Quantität bestimmen. Dabei findet man, daß die Quantität des verbrannten Kohlenstoffs, (wenn man die Quantität der noch nicht verbrannten Kohle sammt der entstandnen Asche von der ganzen Quantität der Kohle abzieht, so findet man diese Quantität,) zu der Quantität des erlangten kohlenfauren Gas sich verhalte wie 28 zu 100, und zu der Quantität der verbrauchten Lebensluft, wie 28 : 72.

Wenn z. B. 100 Grane kohlenfaures Gas erzeugt worden, so sind 28 Grane Kohle verbrannt und die Lebensluft hat um 144 Kub. zoll = 72Gr. abgenommen.

Hingegen kann man aus vollkommener, vollkommen trockener und wohl ausgeglüheter Kohle durch die stärkste Weißglühhitze, der man sie in versperrten Gefäßen, (z. B. in einer Retorte mit einer in Wasser gehenden S—Röhre) aussetzt, weder kohlenfaures Gas, noch irgend ein anderes Gas austreiben. Es ist also offenbar, daß bei dem Verbrennen der Kohle in Lebensluft die Kohlen Säure nicht, etwa aus der Kohle ausgeschieden, sondern aus der Kohle und der Lebensluft erst zusammengesetzt wird.

Auch in *atmosphärischer Luft* entsteht, vermöge der Lebensluft, welche sie enthält, durch Verbrennung der Kohle kohlenfaures Gas.


2) *Zerlegung.* Wenn man kohlenfauren Kalk und Phosphor in eine gekrümmte (beschlagene) Glasröhre (deren offenes Ende mit Quecksilber gesperrt ist,) eingeschlossen der Glühhitze aussetzt, so wird die Kohlen Säure zersetzt; der Phosphor verbindet sich mit dem Oxygene, der Kohlenstoff wird frei; man findet nachher phosphorsauren Kalk und Kohle. Eben diese Zerlegung erfolgt aus kohlenfaurem Natrum und Phosphor.

Diese

Diese Zerlegung der Kohlenfäure (Smithson Tennant in *philos. Transact.* Vol. 81. p. 182. Ueberl. in Gren's *Journ. der Phys.* VI. S. 229. Pearson in *philos. Transact.* 1792. II. p. 289) ist zweifelhaft gemacht worden durch v. Crell (*chem. Annal.* 1794. I. S. 316) und wird um so mehr zweifelhaft, da der Graf von Muffin-Puschkin (*chem. Ann.* 1797. I. S. 447) aus Phosphor Kohle erhielt, wenn er salzsaure Erden und Metallkalke mit Wasser über ihm kochte, und Goettling auch aus ätzendem (obwohl nicht ganz kohlenfäureleeren) Kali und Phosphor Kohle erhielt (*Taschenb. für Scheidekünstler.* 1798. S. 3.).

§. 264.

Die Kohlenfäure kann auch, ohne Lebensluft, durch *Wasser* aus Kohle erzeugt werden. Wenn man ausgeglühete Kohle mit Wasser befeuchtet glühet, so zersetzt der Kohlenstoff das Wasser (§. 225), es entbindet sich Wasserstoffgas und kohlenfaures Gas.



Wenn man Schwefelkies mit feuchter Kohle einer Destillation aussetzt, so erhält man nach *Lampadius* den hydrogenisirten leichtflüssigen Schwefel (§. 202). Nemlich der dabei entbundene Wasserstoff verbindet sich zum Theile mit dem aus dem Schwefelkiese ausgetriebnen Schwefel.

§. 265.

Das *Hydrogene* zerlegt die Kohlensäure nicht. Wenn Wasserstoffgas und kohlenfaures Gas mit einander in ein Gefäß eingesperrt werden, so bleiben beide ungeändert; man kann das letztere mit Kalkwasser wegwaschen, so bleibt bloßes Gas hydrogene übrig. Auch Erhöhung der Temperatur bewirkt keine Zerlegung.

§. 266.

Auch der *Schwefel* und der *Phosphor* zerlegen wenigstens die bloße Kohlensäure nicht. Sie bleiben in kohlenfaurem Gas ungeändert, und ändern auch das kohlenfaure Gas nicht, weder in höherer, noch in niedrigerer Temperatur.

Daß die brennbaren Stoffe in dem kohlenfauren Gas nicht brennen, ist schon oben (§. 262) im allgemeinen angezeigt. Bei Götting's Versuchen (*Beitr. zur Bericht. der antiphlog. Chemie*. Weimar 1794. Verf. 22 fgg.) wurde jedoch ein Leuchten des Phosphors im kohlenfauren Gas bemerkt, wobei sich ein gelbliches ganz feines Pulver auf dem Boden des Glases absetzte. Allein es hält sehr schwer, das kohlenfaure Gas so zu erhalten, daß gar keine atmosphärische Luft dabei ist: und dann ist auch der Unterschied nicht aus der Acht zu lassen, ob das Gas mit Quecksilber oder mit Wasser gesperrt ist.

Von der scheinbaren Zerlegung der Kohlenfäure im kohlenfauren Kalk durch Phosphor s. oben §. 263.

§. 267.

Die Kohlenfäure ist in der *Natur* ein Grundstoff des in ungeheurer Menge auf der Oberfläche unserer Erde vorrätigen kohlenfauren Kalks, des kohlenfauren Natrunis, — und der Quellwässer. Wenn organische Körper verbrennen, so entsteht aus ihrer Kohle Kohlenfäure, welche dann theils zu Gas wird, theils aber mit dem Kali und der Kalkerde der *Afche* sich verbindet. Athmende Thiere athmen kohlenfaures Gas aus, indem das Gas oxygene, welches sie mit der atmosphärischen Luft einathmen, in ihren Lungen sich mit Kohlenstoffe aus dem Blute verbindet. In der *Atmosphäre* ist mehr oder weniger kohlenfaures Gas, von der Entbindung aus kohlenfaurem Kalk oder kohlenfauren kalischen Salzen, aus gährenden Körpern, von der Verbrennung organischer Körper und vom Ausathmen der Thiere.

§. 268.

Die Kohlenfäure hat eine schwächere Anziehung zu den kalischen Erden und Salzen, als alle andere Säuren. Wenn daher kohlen-

gefäuerte kalische Erden oder Kalien mit anderen Säuren gemischt werden, so entbindet sich die Kohlenensäure und wird zu Gas. Daher das *Aufbrausen* (*Effervescentia*), welches dabei entsteht, wenn tropfbares Wasser mit den Säuren oder Kalien gemischt oder mit den Erden gemenget ist, indem das sich entbindende Gas die Wassertheile mit Geräusch zu Schaum erhebt.

Nur die *Boraxsäure* ist gewissermassen hier auszunehmen, indem bei ihr wenigstens Erhöhung der Temperatur hinzukommen muß, wenn sie die Kohlenläure aus Kalien, oder Erden, austreiben soll.

Eine musterhafte Abhandlung über alle bekannte Verhältnisse der Kohlenensäure ist T orb. Bergman *de acido aëreo*. In dess. *opusc. phys. chem.* I. Lips. 1788. N. 1.

Ueber die Grundstoffe der Kohlenensäure s. Lavoisier über die *Entstehung der Säure, die man fixe Luft oder Kreidensäure nennt* in der *Mem. de l'ac. de Paris*. 1781. p. 448 überf. in Lavoisier's *phys. chem. Schr.* von Link. IV. Greifsw. 1792. S. 115.

2.

Die Schwefelsäure.

§. 269.

In der Betrachtung dieser Säure sind das *Acidum sulphurosum* und das *Acidum sulphu-*

ricum zu unterscheiden (§. 258). Zwischen diesen beiden können noch Zwischengrade Statt finden, in denen man die Säure füglich *Acidum sulphuroso-sulphuricum* nennt.

Die *unvollkommene Schwefelsäure* oder *schweflichte Säure* (*Acidum sulphurosum*) ist eine sehr flüchtige Säure, und daher für sich allein, wenigstens in gemeiner Temperatur, und selbst in der Frostkälte †), Gas, *schweflichtsaures Gas*. Dieses Gas hat mit den meisten Gasarten gemein, weder zum Athmen zu taugen, noch fähig zu seyn, brennbare Stoffe in sich brennen zu lassen. Es hat, als ein salziges Gas, grofse Anziehung zum Wasser *), so dafs es, nicht allein, (wie das kohlensaure Gas) von kaltem, sondern auch vom heissen, Wasser doch langsamer verschluckt, und mit ihm zu tropfbar flüssiger schweflichter Säure wird **). Es röthet die Lakmustinktur und zerstört nachher die Farbe ganz. Es wird vom Kalkwasser verschluckt, ohne dafs dieses trübe wird, indem der Kalk desselben mit der schweflichten Säure zu *Calx sulphurosa* wird, der im Wasser eben so auflöslich ist, als der reine Kalk. Es hat einen starken Geruch, sein Geschmack hingegen ist schwach säuerlich.

Auch dieses Gas und alle bekannte saure Gasarten sind specifisch schwerer als Lebensluft. Ein Pariser Kubikzoll desselben wiegt bei 10° R. und 28" Barometerhöhe nach Lavoisier 1,03820 Gr. (franz.)

†) Monge und Clouet behaupten dieses Gas durch Wirkung grosser Kälte und zugleich der Zusammendrückung tropfbar gemacht zu haben.

*) Dieses Gas kann daher, wie alle salzige Gasarten, nur mit Quecksilber gesperrt werden.

**) Eis, durch das sperrende Quecksilber in dieses Gas gebracht, schmilzt in diesem Gas (nämlich auch in der Temperatur 0° R.) und wird, indem das Gas als Gas verschwindet, zu tropfbar flüssiger schweflichter Säure.

§. 270.

Trocknes schweflichtsaures Gas erleidet keine chemische Veränderung, wenn es mit trockner Lebensluft in einem Gefässe (über Quecksilber) zusammenkommt †); beide Gasarten behalten ihren Gaszustand: läßt man Wasser hinzu, so verschluckt dieses bald das schweflichtsaure Gas, so daß die bloße Lebensluft über ihm stehen bleibt; doch vermindert sich dann allmählig auch die letztere, indem die gewässerte schweflichte Säure nun mehr Oxygene anzieht. Wenn das (nicht ganz entwässerte) Gas der unvollkommenen Schwefelsäure, wie es aus sächsischem Vitri-

öl in hoher Temperatur entbunden wird, in einem mit atmosphärischer Luft gefüllten hinlänglich kalten Gefäße aufgefangen wird, so verdichtet es sich erst zu weissen schweren Dämpfen, dann zu einem weissen festen Salze, das sich an den Wänden sternförmig zu krySTALLISIREN pflegt; wo es in dicken Klumpen sich sammlet, nimmt es, zumal wenn es schon von vollkommener Schwefelsäure befeuchtet ist, fast die Gestalt von Speck an. Wird dieses feste Salz über glühenden Kohlen erhitzt, so verflüchtigt es sich schnell als ein weisser Dampf. Auch ohne Erhitzung giebt dieses weisse Salz an der atmosphärischen Luft beständig weisse Dämpfe von sich. Diese Materie scheint *Acidum sulphuroso-sulphuricum*, d. h. Schwefelsäure in solchem Grade der Oxydation zu seyn, daß sie zwischen dem *Acidum sulphurosum* und *sulphuricum* in der Mitte liegt. Wenn sie mit ein wenig vollkommener Schwefelsäure gemischt wird, so zerfließt sie zu einer braungelblichen tropfbaren Flüssigkeit, die aber ebenfalls, wie sie die atmosphärische Luft berührt, schwere weisse Dämpfe des *Acidum sulphuroso-sulphuricum* von sich giebt.

Es entbindet sich nämlich aus diesem Acidum sulphuroso-sulphuricum, wenn es in *offenen* Gefäßen steht, immerfort Acidum sulphurosum (vermöge seiner Flüchtigkeit, auch in gemeiner Temperatur,) als Gas; wie dieses die atmosphärische *Luft berührt*, erhält es so viel Oxygene und Wasser, daß es wieder zu Dampfe von Acidum sulphuroso-sulphuricum wird. Wenn das Acidum sulphuroso-sulphuricum in *verschlossnen* Gefäßen steht, auch wenn es dieselben nicht ganz anfüllt, so sieht man die weissen Dämpfe nicht, weil das im Gefäß schon enthaltene, schweflichtsaure Gas, ohne Berührung der atmosphärischen Luft, Gas und daher durchsichtig bleibt. Sobald das Gefäß geöffnet und ein wenig geschüttelt wird, so wird das schon in ihm über der tropfbaren Flüssigkeit vorhandene schweflichtsaure Gas herausgestossen und in den weissen Dampf des Acidum sulphuroso-sulphuricum verwandelt.

†) Dieses gilt wenigstens von gemeiner Temperatur. Fonrcroy und Vauquelin haben beobachtet, daß wenn ein Gemeng von schweflichtsaurem Gas und Lebensluft durch eine rothglühende Röhre (von welcher Materie?) gehen, das Acidum sulphurosum in Acidum sulphuricum verwandelt werde, das sich dann durch Abkühlung zu einer tropfbaren Flüssigkeit verdichte. Am unten ang. Ort §. 3.

§. 271.

Die *vollkommene Schwefelsäure* (*Acidum sulphuricum*) ist viel weniger flüchtig, als die unvollkommene, so daß sie in der gemeinen Temperatur tropfbar und geruchlos

ist. Um zu kochen, bedarf sie einer sehr hohen Temperatur (540° Fahr.); sie giebt aber dabei kein bleibendes Gas, sondern ein solches, das bei wenig niedrigerer Temperatur sich schon in schwere weisse Nebel verwandelt, die dann mehr abgekühlt tropfbar werden. Sie ist also viel feuerbeständiger, als Wasser, und lässt sich daher durch eine Zeitlang fortgesetztes Kochen in hohem Grade entwässern, da sie denn eine grosse specifische Schwere (1,300 bis 2,000) erhält. Doch hat sie auch im entwässertsten Zustande immer etwas Wasser, das sich von ihr, so lange sie bloße Säure bleibt, nicht abscheiden lässt, weil sie nicht feuerbeständig genug ist, um sich durch Glühhitze ganz austrocknen zu lassen. Sie ist viel leichtflüssiger, als jenes Acidum sulphuroso-sulphuricum, und auch im entwässertsten Zustande ist sie völlig farblos.

Entwässerte Schwefelsäure (Acidum sulphuris dephegmatum) heisst daher, wenn von bloßer Schwefelsäure die Rede ist, nicht solche Schwefelsäure, welche ganz ohne Wasser ist, sondern solche, welche nur das wenige Wasser hat, das sich von ihr nicht trennen lässt. *Gewässerte (aquosum, dilutum)* heisst solche, welche ausser diesem (wesentlichen) Wasser auch noch mehr oder weniger andres hat.

Man nennt die entwässerte Schwefelsäure im gemeinen Leben *Vitriolöl* (*Oleum Vitrioli*); Oel, weil, wenn sie destillirt wird, ihre Tropfen sich ölartig an den Wänden der Gefäße herunterziehen: und Vitriolöl, weil sie aus Eisenvitriol gewonnen werden kann. Das daraus gewonnene (*Sächsisches, Nordhäuser, Goslarische Vitriolöl*) besteht eigentlich aus Acidum sulphurosum und Acidum sulphuricum, weil das Eisen des Vitriols bei der Destillation einen Theil des Oxygene der Säure behält, und daher als Eisenhalbsäure zurückbleibt. Es sieht daher braungelblich aus, und giebt, in offenen Gefäßen stehend, immer Acidum sulphurosum als Gas von sich, das dann bei Berührung der atmosphärischen Luft vermöge des Oxygene derselben und des Wassers zu weißem Dampfe des Acidum sulphuroso-sulphuricum wird. Schon in geringer Kälte, die wenig unter den Frostpunct des Wassers geht, entstehen in ihm weisse feste, oft krySTALLINISCHE, Klumpen, welche eben so beschaffen sind, als jene KrySTALLen des Acidum sulphuroso-sulphuricum (§. 270). In älteren Schriften nennt man diese *Oleum Vitrioli glaciale*. Chaptal fand bei der KrySTALLISATION einer grossen Quantität die Gestalt der KrySTALLen ein plattgedrucktes sechsseitiges Prisma mit sechsseitig pyramidalischer Endspitze (*Mem. de l'ac. de Par.* 1784. p. 622. *Crells Annalen* 1790. I. S. 558.

Wenn man dieses Nordhäuser Vitriolöl erst bei gelinder, dann allmählig verstärkter Hitze destillirt, so erhält man in der Vorlage zuerst jene weissen Dämpfe und KrySTALLen von Acidum sulphuroso-sulphuricum: hat man mit der Erhitzung lange genug

fortgefahren, fo ift endlich der Rückftand farbenlofes Acidum fulphuricum, das dann erft bei ftarker Hitze übergeht. Diefes farbenlofe Acidum fulphuricum ift viel leichtflüffiger, als das Acidum fulphurofo-fulphuricum, und gefriert erft in viel niedrigerer Temperatur.

Obwohl das Acidum fulphuricum viel feuerbeftändiger ift, als Waſſer; fo ift doch das Acidum fulphurofum viel flüchtiger als Waſſer. Daher ift auch, wenn man von dem Nordhäuſer Vitriolöl durch Deftillation bei gelinder Hitze fo viel übertreibt, bis der Rückftand farbenlos ift, das in die Vorlage übergegangene viel entwäſſerter, als das in der Retorte zurückgebliebene, wie der Unterſchied des ſpecif. Gewichtes zeigt.

§. 272.

Nicht allein das ſchweſlichtſaure Gas (§. 269), ſondern auch die tropfbare und feſte entwäſſerte Schwefelſäure (§. 270. 271) hat ſtarke Anziehung zum Waſſer. Der atmophäriſchen Luft ausgeſetzt, zieht ſie allmählig Waſſer aus den Waſſerdünſten derſelben an, und wird gewäſſert. Wenn feſte oder tropfbare Schwefelſäure mit tropfbarem Waſſer gemiſcht wird, ſo entſteht Erhitzung, von der Verminderung der Capacität des Waſſers, das durch dieſe Miſchung dichter, daher ein Theil ſeiner gebundenen Wärme frei wird. Dieſe Erhitzung iſt ſo ſtark, daſs das Waſſer, indem es mit der Säure ſich miſcht,

an der Stelle, an welcher dieses geschieht, anfängt zu kochen. Daher der Ton, welcher dabei entsteht, und dem ähnlich ist, welchen glühendes Eisen, in Wasser getaucht, bewirkt.

Je entwässelter die tropfbare oder feste Schwefelsäure ist, desto größer ist die Erhitzung, welche sie mit Wasser bewirkt. Wenn man Nordhäuser Vitriolöl destillirt, und dadurch jenen flüchtigeren Theil von dem feuerbeständigeren abgeschieden hat (§. 271. Note), so findet man, daß jener, nämlich das feste Salz, zu welchem die übergehenden weissen Nebel in der Vorlage sich verdichten, sich mit Wasser viel stärker erhitzt, als die farblose tropfbare Flüssigkeit, die in der Retorte zurückbleibt: wahrscheinlich, weil jenes flüchtige Salz mehr entwässert ist. (S. die genannte Note.)

Wenn entwässerte Schwefelsäure in Wasser getropfelt wird, so ist die Erhitzung desto schwächer, je größer nach Verhältniß der Säure die Quantität des Wassers ist. Denn nur das Wasser, welches die Säure berührt, wird unmittelbar von ihr erhitzt, und diese Hitze wird dann durch Mittheilung desto mehr geschwächt, je mehr angrenzende Wassertheile da sind, welche von der Säure nicht unmittelbar berührt werden.

§. 273.

Die Schwefelsäure besteht aus *Schwefelstoff* (§. 195 — 200 b.) und *Oxygene* (§. 163).

1. *Zusammensetzung.*

- a) Wenn Schwefel in Lebensluft verbrennt, so entsteht unvollkommene Schwefelsäure; die Lebensluft nimmt dabei ab, und um so viel als die entstandene Schwefelsäure den verbrannten Schwefel an Masse übertrifft.

Wenn Schwefel in einem mit Lebensluft gefüllten, mit Wasser gesperrten, Gefäße verbrennt, so entsteht schwefelsaures Gas, das aber wegen der Berührung mit der übrigen Lebensluft und dem Wasser zu weissen Dämpfen (*Acidum sulphuroso-sulphuricum*) wird. Wie das in mit Wasser gesperrten Gefässen geschieht, so nimmt man wahr, dass die Lebensluft sich vermindert, indem das Wasser immer höher und höher steigt, und zugleich die entstandenen schwefelsauren Dämpfe allmählig verschluckt. Auch wenn das Gefäss mit Quecksilber gesperrt ist, erfolgt die Verminderung der Luft, und das Quecksilber steigt, indem die wenig elastischen Dämpfe anfangs durch den Gegendruck der atmosphärischen Luft zusammengepresst werden, dann aber, wie sie mehr und mehr erkalten, endlich in hinlänglich niedriger Temperatur sich zu tropfbarem *Acidum sulphuroso-sulphuricum* verdichten, das man nachher mit Wasser wegwaschen kann. Im letzteren Falle kann man auch das Gewicht der entstandenen Säure einigermaßen bestimmen, indem man bei genauem Verfahren beobachten kann, um wie viel das auswaschende Wasser am Gewichte zugenommen hat. Wenn man nun das Gewicht des verbrannten Schwefels weiss, (das

sich durch Wägung des Schwefels vor dem Verbrennen, und durch Nachwägung der nicht verbrannten Reste finden läßt,) so findet man, daß das Gewicht des verbrannten Schwefels zusammengekommen mit dem Gewichte der verzehrten Lebensluft so viel betrage, als das Gewicht der entstandenen Schwefelsäure.

Bei dem Schwefel hat diese Wägung viele Schwierigkeiten: nur bei großen Quantitäten läßt sich die Zunahme des zur Schwefelsäure gewordenen Schwefels wahrnehmen und einigermaßen bestimmen. Daher ist man auch über das quantitative Verhältniß noch in Ungewissheit.

In der atmosphärischen Luft sind diese Wirkungen, vermöge ihres Gehalts an Lebensluft, ganz dieselben: nur kann man in einem mit dieser Luft gefüllten Gefäße viel weniger Schwefel verbrennen (§. 178).


b) *Acidum sulphurosum*, der atmosphärischen Luft oder der Lebensluft ausgesetzt, wird nach und nach zu *Acidum sulphuricum*, indem es mehr Oxygene anzieht (§. 258).

Man setze braunes rauchendes Nordhäuser Vitriolöl (§. 271. Note) unter eine mit Lebensluft gefüllte Glocke: es entbindet sich aus ihm schwefelsaures Gas, das, wie es die Lebensluft berührt, zu weißem Dampfe wird, der sich denn allmählig verdichtet und niedersinkt. (Die Luft wird dabei vermindert, und das sperrende Quecksilber steigt.) An freier atmosphärischer Luft geschieht diese Wirkung ebenfalls, und endlich wird das

braune Vitriolöl farbenlos. — Nach Fourcroy (*leçons elementaires d'histoire naturelle et de chimie*. I. Paris 1782. 8. p. 186) wird hingegen das Acidum sulphuricum, in durchsichtigen aber gesperrten Gefäßen den Sonnenstrahlen ausgesetzt, dunkelfarbig. Entbindet sich dabei Gas oxygene?

2) *Zerlegung*. Die Zerlegung der Schwefelsäure in ihre Grundstoffe kann durch alle Stoffe bewirkt werden, welche zu dem Oxygene eine grössere Anziehung haben, als der Schwefel: namentlich Kohle und Eisen, und alle andere Metalle, ausgenommen Gold und Platinum. Aber die vollkommene Zerlegung in ihre beiden Grundstoffe geschieht nur dann, wenn sie ganz entwässert ist. So (nämlich ganz entwässert) ist die Schwefelsäure in ihren festen entwässerten Mittelsalzen, z. E. im Gyps (*Calx sulphurica*), im Glaubersalz (*Natrum sulphuricum*) enthalten, denen man auch ihr wenig Kry stallenwasser durch Ausglühen nehmen kann. Wenn man ein solches Salz, z. E. zerfallenes Glaubersalz, mit Eisenfeile, (etwa dem vierten Theile,) vermengt und bis zum Schmelzen des Salzes glühet, so wird die Schwefelsäure zerlegt: das *Eisen* verbindet sich mit dem *Oxygene* der Säure zu Eisenhalbsäure, und der *Schwefel* tritt mit dem *Natrum* zu sogenannter

Schwefelleber (*Natrum sulphuratum*) zusammen. Dasselbe geschieht, wenn man statt des Eisens Holzkohlenstaub nimmt, ausgenommen, daß dabei der *Kohlenstoff* sich mit dem *Oxygene* der Schwefelsäure zu Kohlenensäure verbindet, die dann als Gas entweicht.



Die bloße Schwefelsäure läßt sich (wahrscheinlich deswegen, weil sie sich, als solche, nicht ganz entwässern (§. 271), mithin sich nicht bis zu der nöthigen hohen Temperatur erhitzen läßt, ohne schon früher als Dampf zu entweichen,) durch jene Stoffe nicht *vollkommen* zerlegen, sondern sie wird durch sie nur unvollkommen zerlegt. Der zerlegende Stoff zieht nur einen Theil A des *Oxygene* an und oxydirt sich, der andere B bleibt mit dem Schwefel verbunden und giebt unvollkommene Schwefelsäure. Auch diese

diese Zerlegung erfolgt nur in höherer Temperatur, über dem Siedgrade des Wassers, und schnell erst dann, wenn die Schwefelsäure siedet.

Diese Zerlegung bewirken nicht allein bloße Kohle, sondern alle thierische und vegetabilische Stoffe, z. B. Oele, vermöge ihres Kohlenstoffes und Wasserstoffes; ja diese bewirken sie schneller und mehr, als die bloße Kohle.

§. 274.

Das *Hydrogene* hat in höherer Temperatur eine größere Anziehung zum *Oxygene* als der Schwefel. Gas hydrogene und schweflichtsaures Gas äußern in niedriger Temperatur keine Wirkung auf einander: wenn man aber ein Gemenge aus (3 Theilen) Gas hydrogene und (1 Theil) schweflichtsaurem Gas (dem Volumen nach, durch ein stark erhitztes gläsernes oder porcellanenes Rohr gehen läßt, so entstehen geschwefeltes Wasserstoffgas und Schwefelkrystalle †). Es muß also der schweflichten Säure das *Oxygene* entzogen worden seyn.

†) Nach Fourcroy und Vauquelin (*sur l'acide sulfureux. Journal de l'ecole polytechnique. Cahier IV. Ueb. in Bourguets n. Beschäft. der neufränkischen Naturforscher. 1. Heft. Berl. 1797. S. 7.*)

§. 275.

Wenn man *Phosphor* und *Acidum sulphurosum* (schweflichtsaures Gas) mit einander in einer gläsernen Röhre erhitzt, so bleiben beide unverändert †) Wenn man aber *Acidum sulphuricum* (1 Loth) über *Phosphor* (1 Drachme) abzieht, so verwandelt der *Phosphor* sich in *Phosphorsaure* ††). Er scheint also wenigstens in so fern eine grössere Anziehung zum *Oxygene* zu haben, als der Schwefel, daß er dem *Acidum sulphuricum* dasjenige *Oxygene* entzieht, welches dasselbe ausser dem *Acidum sulphurosum* hat.

†) Nach *Fourcroy* und *Vauquelin* S. 8. Ferner: wenn schweflichtsaures Gas und phosphorhaltiges Wasserstoffgas einander berühren, so verlieren beide ihren Gaszustand, es entsteht ein weisser Dampf, und es setzt an den Wänden des Gefäßes sich eine gelbe Materie nieder, welche auf heisses Eisen gelegt, erst (?) mit den Charakteren des Schwefels, nachher mit denen des Phosphors verbrennt. S. 9.

††) *Marggraf's chym. Schriften*. I. Berlin 1768. S. 84.

§. 276.

Der *Kohlenstoff* hat eine grössere Anziehung zum *Oxygene*, als der Schwefel. Wenn man *Acidum sulphuricum* über *Holz-kohlenstaub* kochen lasset, so entbindet sich

Acidum sulphurosum. Wenn Acidum sulphurosum als Gas durch eine Glasröhre streicht, in welcher glühende Holzkohle liegt, so geht kohlenfaures Gas über, und es scheidet am Ende der Röhre krySTALLINISCHER Schwefel sich aus †) Die ganze entwässerte Schwefelsäure, so wie sie sich in ihren trocknen Mittelsalzen befindet, wird durch Kohle in der Glühhitze vollkommen zerlegt (§. 273).

†) Nach Fourcroy und Vauquelin war das kohlenfaure Gas mit geschwefeltem Wasserstoffgas vermengt. Entweder enthielt die Kohle oder das schweflichtsaure Gas Wasser.

§. 277.

Schwefel bleibt in gewässelter Schwefelsäure ungeändert, so wie auch sie selbst ungeändert bleibt. Wenn aber entwässerte Schwefelsäure mit Schwefel gekocht wird, so wird sie dunkelfarbig und erhält den Geruch der schweflichten Säure. Es scheint also dadurch etwas Schwefel in der Säure aufgelöst, und mithin die Quantität desselben in ihr vermehrt zu werden.

§. 278.

Wenn gewässerte Schwefelsäure mit Stoffen in Berührung kommt, welche dazu fä-

hig sind, das Wasser in der Glühehitze schnell zu zerlegen, namentlich Eisen und Zink, so ersetzt hier, so zu sagen, die Schwefelsäure die Stelle der Glühehitze; das *Wasser*, mit dem die Säure gemischt ist, wird *zerlegt*, und es entbindet sich *Gas hydrogene* (§. 225.)

Dafs hier nicht die Säure zerlegt werde, sondern das Wasser, sieht man daraus, dafs eine bestimmte Quantität Säure, nachdem sie diese Wirkung geleistet hat, eben so viel Kali zur Sättigung bedarf, als eine gleiche Quantität blofse Säure.

§. 279.

Die entwässerte Schwefelsäure ist *ätzend*, und sowohl für vegetabilische, als für thierische Stoffe; sie zerstört die Mischung derselben durch Anziehung des Kohlenstoffes, und Wasserstoffes, — zu ihrem Oxygene (§. 241): bei lebendigen thierischen Körpern geschieht dies mit heftigem Schmerz (Ebend.). Je mehr sie gewässert wird, desto mehr wird diese Kraft geschwächt: viel Wasser (die tausendfache u. s. w. Quantität) hebt sie völlig auf.

Wenn man trockene vegetabilische Körper, z. B. Gummi, Holz, Stroh, in entwässerte Schwefelsäure wirft, so erfolgt eine Art von Verkohlung: es scheidet sich Kohle als schwarzer Staub aus, und es erzeugen sich Essigsäure und unvollkommene ge-

wässerte Schwefelsäure, indem ein Theil des Oxygene der Schwefelsäure dazu angewandt wird, um mit Hydrogene des vegetabilischen Körpers Wasser, mit demselben und Kohlenstoffe Essigsäure zu bilden. Man bemerkt, so wie die Schwefelsäure und der Körper einander berühren, Entstehung brauner oder schwärzlicher Farbe, und eine Erweichung des vegetabilischen Körpers; wenn man dann Wasser zugießt, so erfolgt bei weitem nicht die Erhitzung, als bei ungewässelter Schwefelsäure, und die ausgeschiedne Kohle schlägt sich als ein schwarzer Staub nieder. Man kann hier diese Veränderung so ausdrücken: ganzer vegetabilischer Stoff + entwässerte Schwefelsäure = Kohlenstoff + Essigsäure + unvollkommene wässrige Schwefelsäure. Fourcroy und Vauquelin in *Annales de Chimie*, XXIII, p. 186.

§. 280.

Die Schwefelsäure ist in der Natur häufig als Grundstoff des Gypses, des Schwerpaths des Bittersalzes, des natürlichen Alauns und der Vitriole. Als bloße Schwefelsäure ist sie in der Natur selten, in der Gegend feuerspeiender Berge zu Zeiten, und dann als unvollkommene Schwefelsäure, die aber bald mit anderen ihr verwandten Materien gemischt wird.

Die Salpetersäure.

§. 281.

Eine gewisse Materie, deren Entstehung und Mischung wir nachher einsehen werden, und welche, nach Lavoisier's Theorie von ihr, *Salpeterhalbsäure* (§. 258) heisst, ist für sich allein, auch in den niedrigsten uns bekannten Temperaturen, Gas, und heisst dann *salpeterhalbsaures Gas*, *Salpetergas* (*Gas nitrogenicum*, *Gas azoticum* Gren.). Es gehört zu denen, welche zur Unterhaltung des Athmens und zur Unterhaltung des Brennens brennbarer Stoffe untauglich sind. Es mischt sich nicht mit Wasser, wenigstens sehr langsam und in kleiner Quantität, so dass es durch Wasser streichen kann, ohne davon verschluckt zu werden. Es röthet die Lakmusfarbe (schwach oder gar nicht) †) Es trübt das Kalkwasser nicht, und unterscheidet sich dadurch von dem kohlenfauren und flussfauren Gas. Es ist nicht brennbar, mithin schon dadurch von dem Wasserstoffgas verschieden. Von allen Gasarten unterscheidet es sich darin, dass, sobald es mit Gas oxygene oder atmosphärischer Luft zusammen kommt, ro-

the Dämpfe unvollkommener Salpetersäure entstehn.

Es ist specifisch schwerer, als die Lebensluft: ein Kubikzoll desselben wiegt nach Lavoisier bei 10° R. und 28'' Barometerhöhe 0,54690 Gran (franz.)

*) Das *Salpeterstoffgas* (§. 175) nenne ich *Gas nitrogenium*; das *salpeterhalbsäure* aber *nitrogenicum*, und das unten (§. 293) folgende *nitrogenosum*. Warum ich den Namen Azotum lieber nicht gebrauche, ist oben (§. 176. Note) angezeigt.

†) Ich finde, daß einiges Lakmus in ihm gar nicht, anderes schwach geröthet wird, doch die Röthe an der atmosphärischen Luft wieder vergeht.

§. 282.

Diese unvollkommene Salpetersäure oder *salpetrigte Säure* (*Acidum nitrosum*), ist sehr flüchtig, obwohl minder als die Salpeterhalbsäure, aber flüchtiger als Wasser, zeigt sich daher für sich allein als ein rother Dunst, welcher kaum in gröfserer Kälte (-10° R.) zu einer hochrothgelben tropfbaren Flüssigkeit gerinnt. Sie hat starke Anziehung zum Wasser, und wird schnell von ihm verschluckt.

In den Fällen, in welchen wir diese Säure auch in geringerer Kälte tropfbar erhalten, ist immer entweder Wasser, wenn auch nur als Dunst, oder vollkommene Salpetersäure vorhanden, mit welchen sie sich verbindet, ehe sie tropfbar wird.

Der rothgelbe *Spiritus Nitri fumans* besteht aus dieser Materie und Acidum nitricum.

Aber auch die eben aus Lebensluft und salpeterhalbfaurem Gas, die über Quecksilber zusammen gelassen werden, entstandene unvollkommene Salpetersäure scheint schon etwas wenig Wasser zu enthalten wie trocknes Kali zeigt.

§. 283.

Die *vollkommene Salpetersäure* (*Acidum nitricum*) ist ebenfalls flüchtig, aber weniger als Wasser, und viel weniger, als die unvollkommene Salpetersäure; ihr Dunst gerinnt in mässiger Kälte zu einer farbenlosen tropfbaren Flüssigkeit, welche specifisch schwerer ist, als Wasser. Sie enthält, auch im entwässertsten Zustande, immer etwas Wasser, von dem sie sich nicht völlig abscheiden läßt, weil sie viel zu flüchtig ist, um sich austrocknen zu lassen.

Nach van Mons krySTALLISIRT sich die Salpetersäure in grosser, durch die Kunst hervorgebrachter, Kälte. Scherer's *Journal der Chemie*. 1. 4. S. 449.

§. 284.

Die *Salpetersäure* besteht aus *Nitrogene* (§. 176) und *Oxygene* (§. 163).

Nitrogene 20 oder genauer 20,463

Oxygene 80 — — 79,537

100

100,000.


1) *Zerlegung*. Wenn die Salpetersäure in hinlänglich hoher Temperatur, namentlich Glühehitze, mit einem Stoffe A in Berührung kommt, welcher zu dem Oxygene eine grössere Anziehung hat, als das Nitrogene, so wird dieser Stoff A oxydirt (§. 253), und es entbindet sich *Salpeterstoffgas* (*Gas nitrogenium*). Der Stoff A kann Eisen, Kupfer, — überhaupt jedes Metall seyn, ausser Gold, Platina, Silber und Quecksilber, dann auch Kohle, Schwefel, Phosphor und Hydrogene. Denn alle diese Stoffe haben zu dem Oxygene grössere Anziehung, als das Nitrogene.

Die bloße Salpetersäure ist zu wässrig und zu flüchtig, um die Glühehitze auszuhalten; sie entweicht als Dampf, ehe sie bis zum Glühen erhitzt werden kann.

Aber die *trockne* Salpetersäure in den trocknen Mittelsalzen, die aus ihr und Kali, Natrum u. s. w. bestehen, erleidet diese Zerlegung mit der sogenannten *Verpuffung* (*detonatio*). Wenn nämlich ein solches Mittelsalz (z. E. gemeiner Salpeter) in der Glühehitze mit einem solchen Stoffe A in Berührung kommt, so entbindet sich Salpeterstoffgas, der Stoff A wird oxydirt und

verbindet sich mit dem kalischen Grundstoffe des Salpeters.

Ist der Stoff A *Eisen*, so entsteht *Eisenhalbsäure*, welche von dem zurückbleibenden Kali des Salpeters aufgelöset wird.



Ist der Stoff A *Kohle*, so entsteht *Kohlensäure*, welche zum Theile sich als Gas entbindet, zum Theile an das zurückbleibende Kali tritt. Daher ist alsdann das sich entbindende Gas nicht bloß Salpeterstoffgas, sondern auch kohlenfaures Gas: das letztere kann aber durch Kalkwasser wegge-
waschen (verschluckt) werden, da dann das bloße Salpeterstoffgas übrig bleibt. Das vom Salpeter zurückbleibende Kali ist dann auch nicht bloßes (ätzendes) Kali, sondern kohlenfaures Kali.

Diese Entbindung des Salpeterstoffgas (und kohlenfauren Gas) kann wahrgenommen werden, in dem (4 Theile) Salpeter mit (1 Theil) Eisenfeile (oder Kohlenstaub) in eine eiserne oder messingene Röhre (von ungefähr 8''' im Durchmesser) geschüttet, fest gestampft, dann mit einem glühenden Eisen oder Spahn angezündet, die Mündung unter Waf-

ser gehalten und das sich entbindende Gas durch die in Wasser oder Quecksilber ragende S—Röhre aufgefangen wird. Um 3 Loth Salpeter zu verpuffen, verbrauchte Lavoisier nur 1,5 Drachmen 5 Gr. Kohlen; man thut aber besser, mehr Salpeter- und Eisenfeile oder Kohle zu nehmen, um desto sicherer zu seyn, daß keine Lebensluft aus unzersetztem glühenden Salpeter entbunden, sondern jedes Salpetertheilchen gewiß zerfetzt werde, (indem es von dem glühenden Körper berührt wird). Von dem aufgefangenen Gas wasche man das kohlenfaure Gas durch Kalkwasser weg, so hat man das bloße Salpeterstoffgas. Man wäge das übriggebliebene Kali carbonicum (nachdem man dasselbe durch Wasser aus dem Gefäße ausgelaugt und durch Abdampfung des Wassers trocken dargestellt hat), treibe die in demselben enthaltene Kohlenensäure mit Schwefelsäure aus, und ziehe das Gewicht der Kohlenensäure von dem Gewicht des ganzen Kali carbonicum ab, so hat man das Gewicht des reinen Kali, das im Salpeter enthalten war. Wenn man dieses vom Gewichte des ganzen Salpeters abzieht, so findet man das Gewicht der zerstörten Salpetersäure: und wenn man von diesem das Gewicht des entbundenen Salpeterstoffgas abzieht, das Gewicht des Oxygene der Salpetersäure. (Das letztere ergiebt sich auch aus dem Gewicht der Kohlenensäure, die theils bei der Verpuffung, aus der Kohle und dem Oxygene der Salpetersäure, sich entbindet, theils nachher aus dem rückständigen Kali carbonicum ausgetrieben werden kann, indem 100 Theile Kohlenensäure 72 Theile Oxygene enthalten §. 263.) Durch diese Ana-

lyse und Berechnung fand Lavoisier das Verhältniß des *Salpeterstoffes* zum *Oxygene* in der Salpetersäure $\equiv 20,463 : 79,537$. S. dessen *Abh. über die Zerlegung des Salpeters durch Kohlen* in den *Mem. de Math. et Phys. présentés à l'acad. des sc. de Paris* P. XI. p. 625. überf. in Lavoisier's *phys. chem. Schr.* V. S. 123.

2) *Zusammensetzung.* Wenn man *Salpeterstoffgas* und *Gas oxygene* in ein Gefäß zusammentreten und elektrische Funken durchschlagen läßt, so entsteht, indem beide Gasarten allmählig verschwinden, Salpetersäure. In der Lauge von reinem Kali, welche in die mit Quecksilber gesperrten Gasarten hineingelassen wird, entsteht *Kalintricum* (Salpeter), im Kalkwasser *Calx nitrica*.

Die Entdeckung dieser Zusammensetzung machte Henry Cavendish (*Crell's chem. Annalen*, 1786. I. S. 96.); Gilpin (*Philosoph. Transactions* Vol. 78. p. 26. Ueberf. in Gren's *Journal der Phys.* I. S. 282.) wiederholte die Cavendishschen Versuche und bestätigte sie. Man nahm künstlich bereitetes Gas oxygene + atmosphärischer Luft, also Gas oxygene + dem Salpeterstoffgas der atmosphärischen Luft, weil diese aus Gas oxygene und Salpeterstoffgas besteht (§. 178. 175.) Das Gas oxygene war nicht aus Salpeter, sondern aus schwarzer Quecksilberhalbsäure, die durch Schütteln des metallischen Quecksilbers mit Blei bereitet war, oder

aus Hydrargyricum sulphuricum (Mineralturpeth); auch das Kali war aus Tartarus ohne Salpeter erhalten. Man nahm verschiedene Verhältnisse der Gasarten: das schicklichste schien das von 4 Theilen gemeiner Luft und 4 Theilen Gas oxygene zu seyn, welches ungefähr 3 Theile Salpeterstoffgas und 5 Theile Gas oxygene enthält; dies Gemisch verschwand fast ganz. Aber es entsteht auch dann, obwohl wenig Salpetersäure, wenn durch bloße atmosphärische Luft wiederholt elektrische Funken geschlagen werden. Eben das scheint bisweilen in der Atmosphäre zu erfolgen: denn Gewitterregen enthält (immer oder bisweilen?) ein wenig Salpetersäure.

Wenn der Salpeterstoff aus Hydrogene und Oxygene bestände (§. 177. b), so entstände die Salpetersäure aus *Hydrogene* und *Oxygene*, und enthielte also eben die Grundstoffe, welche das Wasser enthält (§. 225), nur in anderem Verhältnisse. Wahrscheinlich aber spielt bei dieser Erzeugung der Salpetersäure auch die Elektricität eine wichtigere Rolle, als daß sie bloß dienen sollte, die Gasarten zu mischen. Obwohl bei jener Zerlegung der Säure, durch die Verpuffung des Salpeters, Salpeterstoffgas entbunden und der zugesetzte Stoff A (z. E. Eisen) oxydirt wird, also Salpeterstoff und Oxygene sich zeigen, so folgt doch daraus nicht, daß nicht noch ein dritter Stoff (der *Lichtstoff*?) zur Salpetersäure gehöre, welcher in der erhöhten Temperatur, die bei dem Verpuffen Statt findet, auch entmischt werden kann, ohne daß wir es bemerken, (weil die Glühhitze ohnedem mit Leuchten verbunden ist?)

§. 285.

Auch die *Salpeterhalbsäure* (§. 281) besteht aus *Salpeterstoff* (§. 176) und *Oxygene* (§. 163), nur in einem anderen Verhältnisse: sie enthält viel weniger Oxygene, als die *Salpetersäure* (§. 258).

<i>Salpeterhalbsäure</i>	{	<i>Nitrogene</i> 20,5
	{	<i>Oxygene</i> 43,5
<i>Oxygene</i>		36,0
		100,0

Isaac Milner (*Philos. Transact.* Vol. 79. 1789. p. 300. Uebers. in Gren's *Journal der Phys.* III. S. 83.) liess salpeterhalbsaures Gas durch eine glühende eiserne Röhre streichen, und es entband sich Salpeterstoffgas, (indem das Eisen oxydirt wurde.)

Das Verhältniß des Oxygene zum Salpeterstoffe in der Salpeterhalbsäure wird gefunden, in dem man 1) findet, welches das Verhältniß des Oxygene zur Salpeterhalbsäure in der Salpetersäure sey (§. 288.), und 2) dieses mit dem Verhältnisse des Oxygene zum Salpeterstoffe in der Salpetersäure (§. 284) vergleicht.

§. 286.

Wenn *bloffe*, tropfbare *Salpetersäure* (welche immer, auch im entwässertsten Zustande, etwas Wasser hält,) mit Stoffen zu-

ein kleiner Theil der Salpetersäure ganz zerlegt wird.

Wenn aber höhere Temperatur hinzukommt und die Salpetersäure im Dampfzustande ist: namentlich, wenn *Dampf*, der aus starker, gelinde kochender, Salpetersäure sich entbindet, durch eine *glühende eiserne* Röhre streicht, so entbindet sich mit *salpeterhalbsaurem* Gas sehr viel *Salpeterstoffgas*.

Gesättigte Lauge von *Ferrum sulphuricum* (grünem Vitriol) verschluckt das salpeterhalbsaure Gas und läßt hingegen das Salpeterstoffgas übrig. S. unten *Ferrum sulphuricum*.

§. 287.

Je weniger *Wasser* die Salpetersäure hält, desto schneller und stärker erfolgt diese Zerlegung: je mehr Wasser, desto langsamer und schwächer. Wenn die Säure mit zu viel Wasser verdünnt ist, so erfolgt sie gar nicht: wie viel Wasser aber genug sey, sie zu hindern, das hängt von dem Grade der Anziehung des Stoffes, der die Zerlegung bewirkt, zum Oxygene ab. Eine Salpetersäure, die z. B. genug gewässert ist, um nicht mehr durch Quecksilber zerlegt zu werden, wird doch noch durch Kupfer zerlegt. Bei gewissen Metallen, die auch das Wasser zerlegen, erfolgt, wenn die Säure sehr gewässert

fert

fert ist, zugleich Zerlegung des Wassers und eine andere Zerlegung der Säure.

S. unten §. 295.

§. 288.

Wenn *Salpeterhalbsäure* (§. 285) und *Oxygene* (§. 163), (beide als Gas, denn sie existiren jedes für sich allein nur im Gaszustande,) zusammen kommen, so verlieren beide, (indem zugleich ihre gebundene Wärme frei und daher die Temperatur erhöht wird,) ihren Gaszustand, und mischen sich mit einander zu rothem Dunste von *Acidum nitrosum* (§. 282.), der, wenn er mehr Oxygene anzieht, zu *Acidum nitricum* (§. 283) wird. Waren die Gasarten mit Wasser gesperrt, so verschluckt dieses den Dunst der Säure sehr schnell und tritt vermöge des Druckes der außern Luft in das Gefäß so weit hinauf, daß es den Raum der verschwundenen Gasarten ausfüllet. Das Verhältniß der beiden Gasarten sey, welches es wolle, so entsteht immer der rothe Dunst des *Acidum nitrosum* u. s. w.; weil aber zu der Salpetersäure in jedem Grade der Oxydation ein bestimmtes Verhältniß des Oxygene und Salpeterstoffes gehört, so bleibt, wenn die beiden Gasarten nicht gerade in diesem Verhältnisse da sind, entweder Gas oxygene oder

salpeterhalbfaures Gas übrig. Wenn hingegen beide Gasarten genau in dem Verhältnisse (§. 284) beisammen sind, das zur Salpetersäure gehört, so verschwinden beide ganz, weil sie ganz zur Säure vereinigt werden und das Sperrungswasser tritt dann bis zum obersten Ende des Gefäßes hinauf.

Wenn man

<i>Salpeterhalbfaures Gas</i>	64 Theile und
<i>Gas oxygene</i>	36

100

zusammentreten läßt, so verschwinden beide Gasarten (ganz) und vereinigen sich zu dunstartigem Acidum nitrosum, dann tropfbarem Acidum nitricum.

Da nun in 100 Theilen Salpetersäure

Salpeterstoff 20,5 Theile

enthalten sind (§. 284), so ziehe man diese von den 64 Theilen Salpeterhalbfaure ab; dann ergiebt sich die Quantität des

Oxygene 43,5

in der Salpeterhalbfaure (§. 285).

Es ist jedoch zu merken, daß beide Gasarten in keinem Verhältnisse ganz verschwinden: in einem nach Verhältniß der Quantität weiten Gefäße bemerkt man kaum, daß etwas übrig bleibt, weil darin ein Kubikzoll nur eine geringe Höhe einnimmt; aber in einem engen Gefäße ist es merklicher. Dies ist *Salpeterstoffgas*, welches in dem salpeterhalbfauren Gas enthalten war (§. 286.)

§. 289.

Wenn *salpeterhalbsaures Gas* mit *atmosphärischer Luft* zusammenkommt, so entsteht ebenfalls *Acidum nitrosum* als rother Dunst aus ihm und dem Gas oxygene der Atmosphäre, und das Stickgas der Atmosphäre bleibt übrig. Eben das gilt aber auch von jeder andern Gasart, welche Gas oxygene enthält, so daß die Gasarten übrig bleiben, welche nicht Gas oxygene sind.

Weil das salpeterhalbsaure Gas sogleich zu unvollkommener Salpetersäure wird, sobald es die atmosphärische Luft berührt, so entstehen auch über der Salpetersäure rothe Dünste, wenn Kupfer, Quecksilber oder andere sie zerlegende Körper mit ihr in Berührung kommen, und dabei ihre Oberfläche der atmosphärischen Luft ausgesetzt ist. Sie entstehen aus dem salpeterhalbsauren Gas, das sich aus ihr entbindet und dem Oxygene der atmosphärischen Luft. Wenn aber das enthaltende Gefäß (Entbindungsflasche) mit einem Stöpsel verschlossen wird, aus dem eine in Wasser tretende S - Röhre geht, so steigen in das Sammlungsgefäß nur farblose Blasen des salpeterhalbsauren Gas auf. Doch zeigen sich anfangs rothe Dünste des *Acidum nitrosum* in der Entbindungsflasche, nämlich in dem Luftraume über der tropfbaren Säure, bis die Lebensluft der in dem Gefäße über der Säure enthaltenen atmosphärischen Luft zerstört ist.

Von der Anwendung des salpeterhalbsauren Gas in der *Eudiometrie* s. unten im *prakt. Theile*.

§. 290.

Die gemeine starke Salpetersäure, welche unter dem Namen *rauchende Salpetersäure* (*Spiritus Nitri fumans*) bekannt ist, und durch entwässerte Schwefelsäure aus sehr trockenem Salpeter ausgetrieben wird, ist gleichsam aus beiden zusammengesetzt, hält zwischen unvollkommener und vollkommener Salpetersäure das Mittel, und ist daher zwar von hochrothgelber Farbe, aber doch, auch ohne starke Erkältung, tropfbar (§. 282. 283). Sie ist desto unvollkommener, je unvollkommener die Schwefelsäure war, mit welcher sie ausgetrieben worden, weil diese, vermöge der näheren Verwandtschaft des Schwefels zum Oxygene ihr desto mehr Oxygene entzog, je weniger in ihr der Schwefel damit gesättigt war. Je größer die Vorlage war, in welcher sie aufgefangen worden, und je mehr bei der Destillation die Luft Zutritt hatte, desto minder ist sie unvollkommen, weil sie aus der atmosphärischen Luft Oxygene anzieht. Wenn man sie in offenen Gefäßen rasch sieden läßt, so entbindet sich aus ihr salpeterhalbsaures Gas, (das nur, wie es die Luft berührt, zu rothen Dämpfen von Acidum nitrosum wird;) dadurch wird die Quantität ihres Salpeter-

stoffes relativ vermindert, und mithin der Rückstand endlich Acidum nitricum. Auch ohne Erhitzung giebt sie an der Luft immer rothgelbe Dämpfe, indem die flüchtigere unvollkommene Salpetersäure auch in geringer Temperatur aus ihr verdunstet (§. 282).

Wenn hingegen starke farbenlose Salpetersäure in gesperrten Gefäßen erhitzt wird, so wird sie wieder gefärbt, indem dabei zugleich Gas oxygene entbunden, mithin das Verhältniß des Nitrogene zum Oxygene geändert und das Acidum nitricum in nitrosum verwandelt wird. Nach Priestley's Versuchen geschieht dies nicht bloß im Sonnenscheine, sondern auch, wenn die gläsernen Gefäße, in denen die Säure enthalten ist, in undurchsichtige (eiserne) Röhren eingesperret sind, zum Beweise, daß das Licht an dieser Wirkung keinen Antheil hat. (*Philos. transact.* Vol. 29. 1789. P. 2. p. 159. v. *Crell's chem. Ann.* 1795. I. S. 464.)

§. 291.

Diese starke Salpetersäure ist ätzend (§. 241) für thierische und vegetabilische Stoffe, in dem diese vermöge ihres Kohlenstoffes, Wasserstoffes und Phosphors sie zerlegen, Oxygene aus ihr anziehen und dadurch Zerstörung ihrer Mischung erleiden.

§. 291. b.

Wenn man diese Salpetersäure (§. 290) mit Wasser mischt, so wird sie dadurch nicht

allein gewässert, sondern auch vollkommener; denn es entbindet sich bei der Mischung, vermöge einer noch unbekannten Wirkung *) des Wassers, aus ihr salpeterhalbfaures Gas. Daher verändert sich ihre Farbe bey dieser Mischung, mit der Zunahme des Wassers, nach und nach, weil zugleich die relative Quantität des Oxygene in ihr zunimmt, aus der hochrothgelben in die grüne, aus dieser in die blaue, und endlich wird sie farbenlos. Das gemeine *Scheidewasser* ist eine solche bis zur Farbenlosigkeit gewässerte Salpetersäure, enthält aber meist mehr Wasser, als der Säure dazu hinreicht, farbenlos zu seyn.

*) Ob nicht zugleich ein Theil des Wassers zerlegt und Gas hydrogene entbunden wird, so daß die Salpetersäure durch das Oxygene des Wassers sich mehr oxydirt? Es widerspräche dieses nur der Erfahrung §. 296. Tromsdorf (*Journ. der Pharm.* IV. 2. S. 103) erhielt bei der Mischung der Salpetersäure mit Wasser salpeterhalbfaures Gas, oxydirtes Salpeterstoffgas und Salpeterstoffgas.

§. 292.

Wenn die rothgelbe Salpetersäure (§. 290) in offenen Gefäßen der atmosphärischen Luft ausgesetzt wird, so wird sie nicht allein durch das Oxygene der Luft nach und nach

mehr oxydirt, sondern sie zieht auch Wasserdunst aus ihr an, und wird allmählig gewässert. Daher erleidet sie nach und nach, nur langsamer, eben die Farbenveränderungen (§. 291). Wenn man eben diese rothgelbe Salpetersäure wiederholt destillirt, und ihre Dünste in einer geräumigen Vorlage auffängt, so wird sie endlich ganz farbenlos.

§. 293.

Wir haben hier drey Stufen der Oxydation des Salpeterstoffes angemerkt, nemlich in der Salpeterhalbsäure, der unvollkommenen Salpetersäure und der vollkommenen Salpetersäure. Es ist aber jetzt noch eine tiefere Stufe anzumerken in dem oxydirten Salpeterstoffgas, Salpetersäurestoffgas, (*Gas nitrogenosum*) (§. 281), einer sehr merkwürdigen Gasart, welche vom salpeterhalbsauren Gas ganz verschieden ist. Sie unterscheidet sich nämlich von ihm erstlich darin, daß sie, mit Lebensluft oder atmosphärischer Luft zusammenkommend, keine rothe Dünste giebt, auch keine Verminderung erleidet, ja nicht einmal mit dem Gas der übersauren Salzsäure rothe Dünste giebt u. s. w. und fürs andere sowohl von ihm, als allen anderen unathembaren Gasarten, darin, daß

eine Wachs - oder Unschlittkerze in ihr, ja mit größerem Glanze, brennet und nur glimmend in Flamme ausbricht. Hingegen unterscheidet sie sich von der Lebensluft sowohl darin, daß sie nicht athembar ist, sondern athmende Thiere erstickt, als darin, daß sie mit salpeterhalbsaurem Gas keine rothe Dünste giebt, auch keine Verminderung erleidet, und darin, daß sie nicht zum Verbrennen jedes brennbaren Körpers dient, sondern Kohle, Schwefel und Phosphor in ihr verlöschen. Von beiden unterscheidet sie sich darin, daß sie vom kalten Wasser langsam verschluckt wird.

Vom kohlenfauren Gas unterscheidet sie sich darin, daß ätzende Kalien durch sie nicht geändert werden, auch sie nicht einschlucken, und von allen sauren Gasarten darin, daß Wasser, welches sie einschluckt, die Lakmustinctur nicht röthet.

Priestley hat dieses Gas schon entdeckt und beschrieben unter dem Namen *dephlogistirte Salpeterluft* (*Vers. und Beob. über verschied. Gatt. der Luft*. I. S. 208. 209. III. S. 16. 22. 126, 128, 133. *Deß. Vers. und Beob. über verschied. Theile der Naturlehre*. I. S. 49. 50. II. S. 156. 165. 306). Die holländ. Chemisten aber, Deiman, Trostwyk, Nieuwland, Bondt und Lauwrenburgh haben dasselbe von neuem untersucht.

(Gren's n. Journ. der Phys. I. S. 243.) und nennen es *gasartige azotische Halbsäure* (*Oxyde gazeux d'Azote*).

§. 294.

Das salpeterhalbsaure Gas (§. 285. 286) kann in dieses Gas verwandelt werden durch Stoffe, welche dem Oxygene näher verwandt sind, als der Salpeterstoff; namentlich durch angefeuchtete Eisenfeile, angefeuchtete Schwefelleber, salzsaure Auflösung des Zinnes, indem man nämlich diese Stoffe eine Zeitlang in dem Gas stehen läßt. Diese Stoffe oxydiren sich, das Gas wird vermindert, und das übrige Gas ist dies oxydirte Salpeterstoffgas. Daraus schliessen wir, dafs dieses Gas noch weniger Oxygene enthalte, als das salpeterhalbsaure Gas.

§. 295.

Es kann aber dieses Gas auch auf andere Weise entstehen: vorzüglich reines durch Auflösung des Zinkes in Salpetersäure mit vielem Wasser verdünnt, am reinsten im Anfange der Auflösung; dann auch durch Auflösung des Eisens und des Zinnes in der gleichen Säure: durch Auflösung des Eisens in einem Gemisch von gewässerter Schwefelsäure und gewässerter Salpetersäure, (wel-

che erst Wasserstoffgas, dann dieses Gas, und zuletzt salpeterhalbfaures Gas giebt;) durch Auflösung des Zinks in gewässertem Königswasser; durch Erhitzung des flammenden Salpeters, der, um die Zersetzung langsamer zu machen, mit dreimal so viel feinem Sande vermengt ist, in einer kleinen Retorte, (wobei aber zuletzt viel Salpeterstoffgas zugleich entbunden wird.) Wenn sie vom Wasser verschluckt worden (§. 293), so kann sie durch Kochen desselben wieder sehr rein dargestellt werden.

Bei jenen Auflösungen entsteht wahrscheinlich dieses Gas, indem die Metalle das Wasser sowohl als die Salpetersäure zerlegen; der daher sich entbindende Wasserstoff nimmt dem sich entbindenden salpeterhalbfauren Gas so viel Säurestoff weg, daß dieses in Salpetersäurestoffgas verwandelt wird.

§. 296.

Weder *Kohle*, noch *Schwefel*, noch *Phosphor* können dem oxydirten Salpeterstoffgas das wenige Oxygene entziehen, das es enthält. Daher verlöschen sie in ihm. Bloß das *Hydrogene* ist dazu fähig; d. h. seine Anziehung zum Oxygene ist stärker, als die des Salpeterstoffes. Daher brennt Gas hydrogene in diesem Gas: mit gleichviel oder zwei Drittheilen dieses Gas gemischt,

brennt es mit Explosion ab. Daher brennt auch eine Kerze in diesem Gas, nämlich vermöge ihres Hydrogene.

§. 297.

Die Salpetersäure ist in der *Natur* ein Grundstoff der verschiedenen Arten von natürlichem Salpeter, des gemeinen Salpeters, des wüßlichen, des Kalksalpeters. —

S. unten *Kali nitricum* u. f. w.

4.

Die Salzsäure.

§. 298.

Die Salzsäure, Meersalzsäure oder Kochsalzsäure (*Acidum muriaticum*) ist eine sehr flüchtige Säure; für sich allein auch in den niedrigsten uns bekannten Temperaturen salzsaures Gas. Dieses Gas gehört zu denen, welche weder zur Unterhaltung des Athmens, noch des Brennens *) tauglich sind. Es hat als ein salziges Gas große Anziehung zum Wasser, wird daher vom tropfbaren Wasser, nicht allein vom kalten, sondern auch vom heißen verschluckt: Eis wird in ihm aufgelöst, so daß beide zusammen zu tropfbarer Salzsäure werden. Es röthet, als eine Säure, die Lakmustinktur. Es unter-

scheidet sich aber darin vom kohlenfauren und flussfauren Gas, daß es das Kalkwasser nicht trübt, weil es den Kalk desselben in salzfauren Kalk verwandelt, der im Wasser leicht auflöslich ist. Es wird bei der Berührung der atmosphärischen Luft zu weißem Dampfe, theils indem es aus ihr Oxygene anzieht, dadurch eine geringere Capacität erhält, und dadurch seine Gasgestalt verliert, theils indem es aus ihr Wasserdünste anzieht, und mit ihnen sich zu diesen Dämpfen verdichtet.

Es ist specifisch schwerer, als die atmosphärische Luft. Nach Fontana verhält sich seine spec. Schwere zu der atmosphärischen, wie 1,698:1.000.

*) Es ist merkwürdig, daß dabei die Flamme einer Kerze vor dem Verlöschen und in dem Augenblicke, da man sie wieder anzündet, schön grünlichblau wird.

§. 299.

Die *tropfbare Salzsäure* hat immer mehr oder weniger Wasser; ohne dieses läßt sie sich gar nicht tropfbar darstellen. Wenn sie sehr wenig Wasser hat, so entbindet sich aus ihr, auch in geringer Temperatur, immerfort salzsaures Gas, das dann an der atmosphärischen Luft zu weißem Dampfe wird.

Von dieser Art ist der *rauchende Salzgeist* (*Spiritus salis fumans*, *spiritus salis Glauberi*) der Apotheker.

§. 300.

Die Salzsäure ist bis jetzt noch nicht zerlegt. Wir schliessen von den schon zerlegten Säuren analogisch, dass auch die Salzsäure aus Oxygene und einem säurefähigen Stoffe X bestehe (§. 257), aber bis izt hat man diesen Stoff X noch nicht abscheiden können, weil man noch keinen Stoff gefunden hat, welcher dem Oxygene näher verwandt wäre, als dieser Stoff X. Weder die Kohle, noch der Schwefel, noch der Phosphor, noch der Wasserstoff, noch die bekannten Metalle entziehen diesem unbekannten Stoffe das Oxygene, weder auf dem nassen, noch auf dem trocknen Wege. Weder tropfbare Salzsäure, noch salzsaures Gas, noch die feste Salzsäure im Kochsalz, werden durch jene Stoffe so verändert, dass Zerlegung erfolgte.

Girtanner hat (in der zwoten Ausgabe seiner *Anfangsgr. der antiphlogistischen Chemie*. Berlin 1796. S. 154.) durch Versuche darzuthun gesucht, dass das *Hydrogene* die Basis acidificabilis der Salzsäure sey. S. aber dagegen van Mons in v. Crells *chem. Annalen* 1796. I. S. 451.

Es entbindet sich zwar Gas hydrogene, wenn tropfbare Salzsäure mit Eisen oder Zink in Berührung kommt; allein auch die stärkste tropfbare Salzsäure hat doch etwas Wasser, und dieses ist es, durch dessen Zersetzung dabei das Gas hydrogene entsteht. Wenn in einer bestimmten Quantität von Salzsäure metallisches Zinn und in der gleichen Quantität oxydirtes Zinn aufgelöst wird, so erhält man im ersteren Falle eben so viel Zinnfalz, dessen Säure eben so viel Kali zur Sättigung erfordert, als im zweiten Falle; es kann also das Gas hydrogene, welches im ersten Falle entsteht, nicht durch Zerlegung eines Theils der Salzsäure entstanden seyn. Zwar behauptet Girtanner, daß auch im salzsauren Gas das Eisen oxydirt und Gas hydrogene entbunden werde; allein, war das Gas ganz wasserleer? Van Mons liefs mehrere elektrische Funken durch ein Gemeng von gleichen Theilen salzsaurem Gas und Gas hydrogene gehen, um das Oxygene vielleicht so von dem angeblichen Hydrogene der Salzsäure auf das Hydrogene des Gas hydrogene zu vertheilen, daß Wasser entstünde: es erfolgte aber weder Verminderung des Umfangs, noch Veränderung der Gasarten. Lauwrenburg liefs mehr als 20000 elektrische Funken durch eine mit salzsaurem Gas erfüllte Röhre gehen. Das Gas verminderte sich im Anfange etwas: als diese Verminderung nicht weiter erfolgte, brachte man es über Wasser, wo es fast ganz eingefaugt wurde, weil es salzsaures Gas geblieben war. Ein kleiner Theil wurde nicht eingefaugt, und dieses war Gas hydrogene, allein höchstwahrscheinlich von der Feuchtigkeit des salzsauren Gas, wovon es sich

nicht ganz befreyen läßt. — Wenn man reines Kochsalz, das vorher durch Abknistern in einem glühenden Tiegel seines Wassers beraubt ist, mit (der Hälfte seines Gewichts) Eisenfeile vermengt in einer irdenen Retorte erhitzt, so entbindet sich nichts von Gas hydrogene, überhaupt kein Gas; dahingegen wenn reiner Salpeter auf die gleiche Weise behandelt wird, Gas nitrogene sich entbindet (§. 284).

§. 301.

Hingegen kann man der gemeinen Salzsäure noch mehr Oxygene geben, wie sie als solche hat, dadurch, daß man sie über einer gewissen Metallhalbsäure (metallischem Kalke) abzieht, die sehr viel Oxygene hat, und ihr dabei einen Theil seines Oxygene abtritt. Diese ist das im hohen Grade oxydirte *Magnesiummetall* (schwarzer *Braunstein*.) Gießt man starke Salzsäure auf diese (fein zerriebene) Materie, und läßt mäßige Hitze darauf wirken, so wird die Säure zur überfauren Salzsäure (*Acidum muriaticum oxygenisatum*), die sich dann als ein Gas entbindet, welches alle Eigenschaften einer Säure, aber überdem besondere Eigenschaften zeigt, die es von dem gemeinen salzsauren Gas sehr unterscheiden.

Gren nennt die gemeine Salzsäure *salzige Säure* (*Acidum muriatosum*) und die überfaure Salzsäure

Salzsäure (Acidum muriaticum). Allein die überfaure Salzsäure verhält sich nicht so zur Salzsäure, wie bei den anderen Säuren das Acidum *icum* sich zum Acidum *osum* verhält. Sie ist eben so flüchtig, als die gemeine Salzsäure, wenn nicht noch flüchtiger, da hingegen die Acida *ica* feuerbeständiger sind, als die Acida *osa*. Sie ist als Gas etwas gelblich, das Gas der gemeinen Salzsäure nicht; da hingegen gemeiniglich die Acida *ica* farbenlos, die Acida *osa* farbigt sind. Dann hat sie die ganz ausgezeichnete Eigenschaft, brennbare Stoffe in sich brennen zu lassen, ja sogar in gemeiner Temperatur in sich entzünden zu machen und verdient daher, da diese offenbar von dem *Oxygene* abhängt, welches diese Säure *ausser der gemeinen Salzsäure (Acidum muriaticum)* enthält, auch wohl vor anderen fauren Gasarten den auszeichnenden Namen: *überfaure Salzsäure, Acidum muriaticum oxygenisatum*, um so mehr, da die Mittelsalze, welche aus gemeiner Salzsäure und Kalien oder Erden bestehen, sich ganz wie die Mittelsalze von Acidis *icis*, verhalten; Kochsalz lässt sich z. B. ohne Verlust seiner Säure eben sowohl ausglühen, wie Glaubersalz.

§. 302.

Die überfaure Salzsäure giebt das überflüssige *Oxygene*, d. h. dasjenige, welches sie *ausser der Mischung der gemeinen Salzsäure* hat, sehr leicht ab: lässt sich durch die meisten Stoffe, welche zum *Oxygene*

An-

Anziehung haben, in Oxygene und gemeine Salzsäure zerlegen. Der fremde säurefähige Stoff säuert sich, und wird zu seiner Säure, oder Halbsäure —; die überfaure Salzsäure wird zu gemeiner Salzsäure. Zugleich verwandelt auch das Gas sich zu einem weissen deutlich sichtbaren Dampf, es entbindet sich daher Wärme und die Temperatur wird erhöht.

Ueberfaure		Salzsäure	} Säure oder Halbsäure
Stoff X	Oxygene	Oxygene	
Gemeine Salzsäure		Stoff A	

So wird das *Hydrogene* in dem Gas der überfauren Salzsäure zu *Wasser*.

Der *Schwefel* zu *Schwefelsäure*, der *Phosphor* zu *Phosphorsäure*, die *Kohle* zu *Kohlensäure*.

Alle *Metalle*, auch das Gold und die Platina, werden in dem Gas der überfauren Salzsäure *oxydirt* (verkalkt). Sie verbinden sich dann zugleich mit der entstandenen gemeinen Salzsäure und werden zu *salzsauren Metallsalzen*.

Geschwefelte Metalle, wie Zinnober, Spießglanz, verwandeln sich in diesem Gas, das Metall zu Metallsalz, der Schwefel zu Schwefelsäure: das Metallsalz ist dann schwe-

felfauer oder falzfauer, je nachdem das Metall der Schwefelfäure oder Salzfäure näher verwandt ist.

§. 303.

Da das überschüssige Oxygene in dem Gas der überfauren Salzfäure eben sowohl Gas ist, als die ganze Säure, so können *brennbare Stoffe* in diesem Gas *brennen*, wie in Lebensluft (§. 165). Doch macht die Verbindung des Oxygene mit der Salzfäure dabei eine große Verschiedenheit von der Wirkung der Lebensluft. Einige brennbare Stoffe entzünden sich in diesem Gas von selbst, d. h. sie oxydiren sich schnell auch in gemeiner Temperatur, obwohl sie das in der bloßen Lebensluft nicht thun. Andere müssen erst durch äussere Hitze entzündet werden; dann brennen sie in dem Gas, doch meist viel schwächer, als in Lebensluft, fort. Andere, wenn sie auch vorher durch äussere Hitze entzündet waren, verlöschen in diesem Gas, obwohl sie in Lebensluft brennen.


So geschieht ersteres mit dem *Spießsglanzmetalle*, das, wenn man es fein zervieben allmählig in das Gas hineinstreuet, unter starkem Funkensprühen verbrennt, und, dadurch oxydirt, mit der gemeinen Salzfäure zu falzsaurem Spießglanzsalze sich

verbindet: eben so mit dem *Wismuthe*, *Zinke*, *Arsenikmetalle*, nach Scherer (*Grens Journ. der Phys.* VIII. S. 376) auch mit dem *Golde*. Ferner mit gewissen *geschwefelten Metallen*, dem *Spießglanze*, dem *Zinnober*. Mit dem bloßen *Schwefel* hingegen nicht. Gas *hydrogene* entzündet sich, mit diesem Gas zusammen gebracht, nicht von selbst, doch durch Erhitzung von außen, und dann schnell, mit Explosion, wie mit Lebensluft (§. 192), und mit violetter Flamme. Nach Westrumb's Beobachtung (*Crell's chem. Annalen*. 1790. I. S. 20) brennt in diesem Gas auch der Staub von recht trockner *Kohle* von Buchenholz bei der Temperatur von 70° bis 80° Fahrenheit. Eine in atmosphärischer Luft angezündete *Wachskerze* (*Hydrogene* und *Kohle*) verlöscht in ihm nicht, sondern brennt, aber schwächer und dunkler, fort. Brennender *Phosphor* brennt in dem Gas fort, und entzündet sich sogar in ihm von selbst (H. in den *Beitr. zu Crell's chem. Anal.* I. St. 3. S. 48. und Westrumb a. a. O. S. 8.)

§. 303. b.

Das salpeterhalbsaure Gas zersetzt das Gas der überfauren Salzsäure so, daß jenes zu rothem Dampf der Salpetersäure, dieses zu weißem Dampf der gemeinen Salzsäure wird. Nämlich die überfaure Salzsäure tritt das Oxygene, was sie außer dem der gemeinen Salzsäure hat, an die Salpeterhalbfaure ab. Das *Salpeterstoffgas* und das Gas der

überfauren Salzsäure werden durch einander nicht verändert.



§. 304.

Die überfaure Salzsäure hat große Anziehung zum *Wasser*; kaltes Wasser verschluckt das Gas derselben sehr schnell, und wird zu *tropfbarer überfaurer Salzsäure*. Je heisser das Wasser ist, desto weniger verschluckt es, wegen der Flüchtigkeit dieser Säure, welche desto größere Neigung hat, Gas zu seyn, je höher die Temperatur ist, worin sie sich befindet. Auch diese tropfbare Säure hat die Eigenschaft, alle *Metalle* zu oxydiren, und nachdem dieses geschehen, löset sie dieselbe zu salzsauren Metallsalzen auf.

§. 305.

Auch ohne diese Verbindung mit Wasser ist das überfaure salzsaure Gas in großer Kälte nicht völlig bleibend. Es verwandelt sich wenigstens zum Theile in gelblichte *festen Körper*, mit spießiger *Krystallisation*, wel-

che durch Wärme wieder zu überfaurem salzsauren Gas werden.

Dies bemerkte zuerst Karsten (*phys. chem. Abh.* II. S. 151.), genauer Westrumb (*Crell's chem. Ann.* 1790. I. S. 6.) Wenn man daher den Namen Gas nur für bleibende Gasarten gebrauchen will, so verdient dieses den Namen nicht, und wird dann besser Dunst genannt (§. 130).

Westrumb leitet diese Fähigkeit des Gas fest zu werden von der in ihm aufgelöseten und mitverflüchtigten Magnesiumhalbfäure (Braunsteine) her, indem man diese durch Kalien abscheiden könne (*Crell's chem. Ann.* 1790. II. 45). Vielleicht ist eben dieser die gelblichte Farbe des Dunstes zuzuschreiben, welche er zeigt, wenn er aus starker rauchender Säure und viel Braunstein gemacht ist.

§. 306.

Die meisten *Pflanzenfarben* und *thierischen Farben* werden durch die überfaure Salzsäure, sowohl durch die tropfbare, wenn sie hinlänglich stark ist, als durch die gasartige, zerstört, und in Weiße (Albedo) verwandelt. Wahrscheinlich geschieht dieses, indem die brennbaren säurefähigen Stoffe, von welchen diese Farben abhängen, sich durch das Oxygene der Säure völlig oxydiren (§. 260).

Pearson brachte den Fuß eines Mohren unter eine mit überfaurem salzsauren Gas gefüllte Glocke:

nach dreiviertel Stunden war er ganz weifs; als er ihn mit Seifenwasser wusch, wurde er wieder so schwarz als vorher. Denselben Fuss brachte er wieder unter jene Glocke; er wurde wieder weifs und vom Seifenwasser wieder schwarz. *Annales de Chimie*. XIII. p. 313.

Von der Anwendung zum *Bleichen* s. unten im *prakt. Theile*.

§. 307.

Durch starke Wirkung des *Lichts* (im Sonnenscheine) wird aus der tropfbaren überfauren Salzsäure Gas oxygene entbunden, und die übrige Flüssigkeit zu *gemeiner Salzsäure* verändert (§. 301. 302).

Dies geschieht aber nur durch Wirkung des *Lichts*, nicht durch Wirkung der bloßen Wärme.

§. 308.

Ungeachtet das überfaure salzsaure Gas viel Oxygene hält, und den, welchen es ausser der gemeinen Salzsäure hat, so leicht abgiebt, so ist es doch nicht athembar, sondern tödtet athmende Thiere, sobald sie hineingebracht werden, äusserst schnell. Auch zeigt es eine schädliche reizende Eigenschaft, einen sehr stechenden und widrigen Geruch, erregt, wenn es in und mit atmosphärischer Luft eingeathmet wird, heftigen Husten und verursacht fortdauernde Schmerzen in der Brust.

§. 309.

Wenn man tropfbare Salpetersäure mit tropfbarer Salzsäure mischt, so entsteht ein Gemisch, das gleichsam aus überfaurer Salzsäure und unvollkommener Salpetersäure besteht, indem die Salzsäure an dem Oxygene der Salpetersäure dermassen Antheil nimmt, daß dieses Gemisch gewisse Eigenschaften der überfauren Salzsäure, namentlich die, alle Metalle zu oxydiren und aufzulösen, erhält.

Da es also auch das Gold auflöst, so heisst es daher (weil die Alten das Gold den König der Metalle nennen) *Königswasser* (*Aqua regis*); auch weil das Silber darin niederfällt, Gold aber aufgelöst bleibt, also dieses von jenem dadurch geschieden werden kann, *Goldscheidewasser*.

Eben dieses Gemisch entsteht, wenn fester Salmiak (ein aus Salzsäure und flüchtigem Kali bestehendes Mittelsalz) in Salpetersäure aufgelöst wird, enthält aber dann zugleich flüchtiges Kali.

§. 310.

Die Salzsäure ist in der Natur ein Grundstoff des Kochsalzes und anderer sie enthaltenden Mittelsalze. Als bloße Salzsäure ist sie in der Natur nicht.

S. unten *Kochsalz* u. s. w.

Die Flusssäure.

§. 311.

Auch die *Flusssäure* (*Acidum fluoricum*) ist eine sehr flüchtige Säure: für sich allein auch in den niedrigsten uns bekannten Temperaturen *flusssäures Gas*. Dieses Gas gehört zu denen, welche weder zur Unterhaltung des Athmens, noch des Brennens taugen. Es hat, als ein salziges Gas, Anziehung zum Wasser: und röthet, als eine Säure, die Lakmustinctur. Es unterscheidet sich von dem schwefelsauren und salzsauren Gas darin, daß es, wie das kohlen-saure Gas, das Kalkwasser trübt, indem es den aufgelöseten Kalk desselben in flusssäuren Kalk verwandelt, der im Wasser unlöslich ist: von dem kohlen-sauren hingegen durch seinen eigenthümlichen viel schärferen Geschmack und Geruch, und dadurch, daß es bei Berührung der atmosphärischen Luft zu weißem Dampfe, wie die Salzsäure (§. 237. 298) wird. Von allen übrigen sauren Gasarten darin, daß es mit Kalien und Erden seine besonderen Gemische macht, und insbesondere darin, daß es die Kieselerde auflösen und mit sich in Gas verwandeln

kann. Es ist specifisch schwerer, als die atmosphärische Luft.

Da die Flusssäure Kiesel Erde auflöst, so löset sie Glas, das aus Kiesel Erde und Kali besteht, noch leichter auf.

Die Flusssäure, so wie die Salzsäure, mit Hülfe des Braunsteins als überfaure Säure darzustellen, ist Herrn de Billaud nicht gelungen (Trommsdorff *Journ. der Pharm.* IV. 1. S. 141).

§. 312.

Die *tropfbare Flusssäure* hat immer mehr oder weniger Wasser, ohne das sie sich gar nicht tropfbar darstellen läßt. Auch diese löset Kiesel Erde, obwohl viel weniger, als die luftartige, auf.

Wenn daher Flusssäure als Gas viel Kiesel Erde aufgelöst hat, so setzt sie, wie sie in Wasser kommt, einen grossen Theil davon in Gestalt weisser Häute wieder ab.

§. 313.

Diese Säure ist bis jetzt noch nicht zerlegt.

Es gilt hier *mutatis mutandis* alles, was oben §. 300. von der Salzsäure gesagt ist.

§. 314.

Sie ist in der *Natur* als Grundstoff des Mineralgeschlechts, welches Fluß (*Fluor*) heisst.

Die Phosphorsäure.

§. 315.

Von den bisher betrachteten Säuren ist die vollkommene *Phosphorsäure* (*Acidum phosphoricum*) darin sehr verschieden, daß sie sehr feuerbeständig ist, so daß sie nicht allein, wenn sie im Wasser aufgelöst war, durch Abdampfung des Wassers als ein fester trockner Körper dargestellt werden, sondern auch geglühet werden kann, ohne sich zu verflüchtigen. Diese feste Phosphorsäure ist durch geringe Glühhitze schmelzbar; nach dem Schmelzen erkaltet zeigt sie sich als ein weißer dem Glase ähnlicher Körper. Sie hat auch dann, wenn sie lange und wiederholt geglühet worden, so starke Anziehung zum Wasser, daß sie nicht allein im Wasser leicht aufgelöst wird, sondern schon an der Luft zerfließt; in beiden Fällen entsteht tropfbare oder gewässerte Phosphorsäure, die, wie die feste, farbenlos ist. Ihrer Feuerbeständigkeit wegen ist sie geruchlos, sowohl wenn sie fest, als wenn sie tropfbar ist.

§. 316.

Eben diese Säure kann in geringerem Grade der Säuerung sich befinden. Als sol-

che unvollkommene Phosphorsäure, oder phosphorigte Säure (*Acidum phosphorosum*), ist sie flüchtiger, ohne Wasser ein weisser stark-riechender Dampf, mit Wasser tropfbar flüßig. Sie läßt sich, (ohne Gefrierung ihres Wassers,) nicht als ein fester Körper darstellen, weil sie zu flüchtig ist, und mit Abdampfung ihres Wassers selbst verdampft.

Wenn man unvollkommene gewässerte Phosphorsäure in einem langhalsigen Kolben lange siedet, so bleibt doch endlich feste Phosphorsäure zurück. Dies rührt aber daher, weil die Dämpfe der unvollkommenen Säure, wie sie im Kolben aufsteigen, mehr Oxygene anziehen, und theils zu vollkommener Säure werden, ehe sie aus dem langen Halse des Kolbens entweichen können.

§. 317.

Die Phosphorsäure besteht aus *Phosphorstoff* (§. 204) und *Oxygene* (§. 163).

Phosphorstoff 40

Oxygene 60

100

1. *Zusammensetzung.* Wenn Phosphor (2 Grane) in Lebensluft oder in atmosphärischer Luft (§. 166) verbrennt, so wird er mit dem Oxygene zu unvollkommener Phosphorsäure, welche in weissen Dämpfen aufsteigt. Diese nimmt dann aus der übrigen

Lebensluft noch mehr Oxygene auf, wird zu vollkommener Säure und verdichtet sich als solche zu einem festen weissen Körper (5 Grane). Dabei wird etwas Lebensluft (6 Würfelzolle $\equiv$ 3 Gran) verzehrt, und die Abnahme der Lebensluft ist der Zunahme des zur Säure gewordenen Phosphorus gleich.

Um bei dieser Verbrennung die Abnahme der Lebensluft für eine gewisse Quantität Phosphor zu erfahren, sperrt man die Glocke, in welcher der Phosphorus verbrennt, mit Wasser oder Quecksilber, da dann dieses für jeden Gran Phosphor um 3 Würfelzolle steigt. Hat man Wasser zur Sperrung genommen, so verschluckt dasselbe die Dämpfe der unvollkommenen Säure, ehe sie sich weiter oxydiren; hat man aber Quecksilber genommen, so legt sich die fest werdende Säure auf der Oberfläche des Quecksilbers und auf der inneren Fläche des Glases an. Um die Zunahme des Phosphors zu wissen, muss man eine abgewogene Quantität in einem mit atmosphärischer Luft angefüllten Gefässe mit diesem wägen, es vor der Verbrennung genau verschliessen, nach dem völligen Erkalten wieder öffnen und bei gleicher Temperatur, als vorher, wieder wägen. Wenn nämlich das Gefäss nach dem Verbrennen des Phosphors wieder geöffnet wird, so tritt an die Stelle der verzehrten Lebensluft frische atmosphärische Luft hinein, und das Gefäss sammt seiner enthaltenen Luft wiegt nun, (den kleinen, bei kleinen Quantitäten unbedeutlichen Unterschied in dem spec. Gewicht der Lebensluft und der atmosphärischen abgerechnet)

so viel als vorher. Was also jetzt Zunahme am Gewicht ist, das ist Zunahme des nun oxydirten Phosphorus.

Merkwürdig ist bei dieser Verbrennung des Phosphorus, daß von jeder Quantität Phosphorus, wenn gleich noch genug Lebensluft da ist, um mehr zu verbrennen, ein verhältnismäßiger rothgelber Rückstand bleibt, dessen Natur noch nicht genug untersucht ist. Eben dieser macht die Berechnung der Zunahme des eigentlich verbrannten Phosphorus schwieriger.

Diese Erzeugung der Phosphorsäure aus Phosphor und dem Oxygene der atmosphärischen Luft erfolgt langsamer durch das schwache Verglimmen (Leuchten) desselben bei geringer Temperatur (§. 208). Der weiße Dampf, welchen der Phosphor dabei giebt, ist unvollkommene Phosphorsäure, welche dann aus der Luft Wasser anzieht (oder erzeugt §. 210 b.) und daher als tropfbare Flüssigkeit bei dem verglimmenden Phosphor sich sammlet. Diese Säuerung des Phosphors bei geringer Temperatur geschieht desto stärker, je mehr die Lebensluft mit Stickgas vermischt ist (§. 210).

2. *Zerlegung.* Wenn Phosphorsäure mit Kohlenstaub genau vermengt in einer Retorte stark geglühet wird, so entsteht kohlen-saures Gas und Phosphorus. Nämlich der

Kohlenstoff, welcher dem Oxygene näher verwandt ist, als der Phosphor, entzieht diesem das Oxygene und der Phosphor wird frei.

Kohlenensäure

Kohle

Oxygene

Phosphor

Phosphorsäure

§. 317. b.

Im reinen *Wasser* liegend ist der Phosphorus vor der Wirkung der Luft geschützt. Doch bleibt er auch hier nicht ganz ohne Säuerung. Er scheint das Wasser zu zerlegen, wird mit einer weissen Rinde (Phosphorhalbsäure) beschlagen, das Wasser wird schwach phosphorsaure, dampft, und leuchtet, wenn mans an der Luft bewegt (§. 211), weil phosphorhaltiger Wasserstoff sich aus ihm entbindet, der durch Zerlegung eines Theils des Wassers entstanden ist, und dann etwas Phosphor aufgelöset hat.

Phosphorhalbsäure

Phosphor

Oxygene

Hydrogene

Wasser

§. 318.

Die Phosphorsäure ist in der *Natur* ein Grundstoff des phosphorsauren Kalks, so auch

der thierischen Knochen: der phosphorsauren Mittelsalze im thierischen Harn, des phosphorsauren Bleierzses. —

6.

Die Boraxsäure.

§. 319.

Auch die *Boraxsäure* (*Acidum boracicum*) ist eine sehr feuerbeständige Säure, welche bis zum Glühen erhitzt werden kann, ohne sich zu verflüchtigen, daher durch Abdampfung sich entwässern und als fester Körper sich darstellen und zu einer glasähnlichen Masse sich schmelzen läßt. Sie wird vom Wasser aufgelöst, auch dann, wenn sie durch Glühehitze geschmolzen war. Dies alles hat sie mit der Phosphorsäure gemein (§. 315); sie unterscheidet sich aber von ihr erstlich darin, daß sie im Wasser nicht so leicht aufgelöst wird, auch nicht an der Luft zerfließt, sondern fest und trocken bleibt; zweitens darin, daß sie sich aus ihrer Auflösung, nachdem dieselbe durch Abdampfung hinlänglich entwässert worden, durch hinlängliche Abkühlung in dünnen Schüppchen krySTALLISIRT; drittens darin, daß sie die Eigenschaften der Säuren viel schwä-

cher als die Phosphorsäure und alle andere bekannte Säuren, ausgenommen die Kohlensäure, zeigt.

Wenn sie mit Wasser befeuchtet ist, so können bei starker Hitze die Wassertheilchen, wie sie heftig verdunsten, Theilchen der Säure mit sich fortreissen, so daß diese sich sublimiren. Bei völlig ausgetrockneter Säure geschieht dieses aber, auch durch starke und lange anhaltende Glüehitze, nicht.

§. 320.

Die Boraxsäure ist noch nicht zerlegt.

Es gilt hier *mutatis mutandis*, was oben §. 300 von der Salzsäure gesagt ist. Hr. Hugo Kind hat vor einiger Zeit versucht, die Boraxsäure mit Kohle, Phosphor und Schwefel zu zerlegen, aber vergeblich (*Trommsdorffs Journ. der Pharm.* V. I. S. 89). Nachher habe ich vernommen, daß es dem Herrn BR. von Crell gelungen sey, sie zu zerlegen, und erwarte die Bestätigung dieser Nachricht.

§. 321.

Sie ist in der Natur ein Grundstoff des *Tinkal* oder natürlichen *Borax*: auch hat man schon, obwohl an wenigen Orten, die Säure selbst, in Wasser aufgelöst und fest angetroffen.

Hoefler hat in dem Wasser des *Lagone Cherchijajo* und *Castel nuovo* im Großherzogthum *Toscana*

cana natürliche Boraxsäure entdeckt, und Mascagni hat an den Ufern dieser Seen dasselbe in trockner Gestalt gefunden. S. *Memoria sopra il sale sedativo naturale della Toscana e de Borace che con quello si compone scoperto da Uberto Franc. Hoefler. Firenz. 1778. 8. Uebers. von B. F. Hermann. Wien 1781. 8. Maret in den nouv. mem. de Dijon. 1784. Sem. II. p. 151. üb. in Crelles chem. Ann. 1790. I. S. 69.*

Eilftes Kapitel.

Die Kalien.

§. 322.

Die Kalien, Alkalien, oder kalischen Salze (*Alcalia, Salia calina*) sind Salze (§. 239), welche sich von anderen Salzen durch ihren eigenthümlichen Geschmack *), dadurch, daß sie gewisse Pflanzenfarben auf gewisse Weise verändern **), und endlich dadurch unterscheiden, daß sie zu allen Säuren große Anziehung haben, und mit ihnen Neutralsalze zusammensetzen.

Der Name *Alkali* ist arabischen Ursprungs. *Al* ist der arabische Artikel: man sagt daher im Deutschen besser *das Kali*, als *das Alkali*.

*) Der von den Kalien so genannte *kalische* Geschmack, welcher ihnen allen gemein ist, läßt sich

eben so wenig beschreiben als der bekanntere saure. Man muß ein Kali schmecken, um eine Idee davon zu erlangen.

**) Alle Kalien färben den blauen *Veilchensaft* (aus den Petalis von *Viola odorata* L.) grün: indessen ist dieses kein eigenthümlicher Charakter derselben, auch der Bleizucker leistet die gleiche Wirkung. Die gelbe Tinctur der *Curcuma* wurzel (*Curcuma longa* L. färben sie braun; die gelbe Tinctur der *Rhabarber* wurzel (*Rheum palmatum, compactum, —* L.) braunroth, die rothe Farbe des *Fernambukholzes* violett, die rothe der *Alcannawurzel* (*Anchusa tinctoria* L.) violettblau. (Weiss in *Gren's Journal der Phys.* VIII. 24.)

§. 323.

Die reinen Kalien sind nicht allein sehr scharf (§. 240), sondern auch ätzend (§. 241.) nämlich so, daß sie nicht allein die lebendigen thierischen Fasern sehr heftig reizen, sondern auch die Mischung, sowohl der todten, als der lebendigen Fasern, angreifen und zerstören, indem sie den thierischen Faserstoff auflösen. Bei ihrer Mischung mit Säuren entsteht Erhitzung, weil die Capacität des daraus entstehenden Gemisches geringer ist, als die des Kali und der Säure.

§. 324.

In ihrem gewöhnlichen Zustande sind die Kalien nicht rein, sondern mit Kohlensäure gemischt. Diese *kohlensauren Kalien* (*Kalia carbonica*) sind viel milder als die reinen, und nicht ätzend, daher sie auch *milde* heißen.

I. Feuerbeständige Kalien.

§. 325.

Zwo Arten von Kali sind so *feuerbeständig* (*Kalia fixa*), daß sie einen hohen Grad von Glühehitze aushalten, ohne sich zu verflüchtigen. Sie lassen sich daher durch Hitze entwässern und als feste trockne Körper darstellen, die dann durch gelinde Glühehitze völlig schmelzen. Sie werden vom Wasser, auch in geringer Temperatur, so leicht aufgelöst, daß sie schon an der Luft zerfließen. Beide haben grosse Anziehung zur Kohlensäure, und sind daher in ihrem gewöhnlichen Zustande immer mit ihr begabt; mit dieser gesättigt, verlieren sie ihre Zerfließbarkeit an der Luft.

Als feste Körper sind diese Kalien geruchlos, wegen ihrer Feuerbeständigkeit. Ihre Laugen aber geben einen merklichen widrigen Geruch, der desto stärker ist, je mehr sie erwärmt werden. Destillirt

man diese Laugen, so erhält man doch nur Wasser in der Vorlage, das keine Zeichen von Kali zeigt. Es muß also der Stoff, welcher sich aus ihrer Lauge entbindet, und jenen Geruch bewirkt, ein sehr flüchtiger Stoff seyn, der sich mit dem verdunstenden Wasser nicht verbindet, sondern als Gas entweicht. Es ist noch zu untersuchen, ob man ihn als Gas auffangen und darstellen kann, wenn man bei jener Destillation die Mündung des Helmschnabels mit Quecksilber sperrt.

Nach Lowitzens Entdeckung lassen auch die reinen feuerbeständigen Kalien sich *krySTALLISIREN*, wenn ihre Laugen hinlänglich durch Abdampfung entwässert und dann stark abgekühlt werden. Bei dem Pflanzenkali soll nicht einmal die Winterkälte nöthig, bei dem Mineralkali die Kälte von -5° Reaum. hinreichend seyn. Das Pflanzenkali bildet, wenn es in der warmen Sandkapelle krySTALLISIRT, oktaëdrische, wenn es durch gänzlichendes Abkühlen krySTALLISIRT, rechtwinklicht viereckigt tafelförmige KrySTALLen: eben solche auch das Mineralkali. S. v. Crelles *chem. Annal.* 1796. I. S. 308.

Eine sehr entwässerte Lauge der feuerbeständigen Kalien ist braun: die KrySTALLe aber sind farbenlos, durch wiederholtes KrySTALLISIREN jedesmaliges Abgießen der braunen Lauge und wieder Auflösen der KrySTALLe kann eine farbenlose Lauge erhalten werden. Die braune Farbe scheint daher nicht dem reinen Kali selbst eigen zu seyn, sondern von beigemischtem Kohlenstoff und Eisen herzurühren. *Ebend.*

§. 325. b.

Das Zerfließen an der Luft geschieht wahrscheinlich vermöge des Hydrogene, welches einen Grundstoff der Kalien ausmacht (§. 339), indem dasselbe mit dem Oxygene der Luft sich zu Wasser verbindet (§. 254).

Geschwefeltes Kali, feuerbeständiges.

§. 326.

Beide feuerbeständige Kalien haben starke Anziehung zum Schwefel und können sich mit ihm zu *geschwefelten feuerbeständigen Kali* (*Kali fixum sulphuratum*), sowohl auf dem trocknen, als auf dem nassen Wege, vermischen. Sie schmelzen nämlich in gelinder Glühehitze mit gleichviel Schwefel zusammen; das so entstandene braune Gemisch hat grosse Anziehung zum Wasser, wird darin zu einer tropfbaren klaren gelben Flüssigkeit aufgelöst, und zerfließt schon von selbst an der Luft (§. 185. 254). Eben diese Auflösung entsteht, wenn eine Lauge von feuerbeständigem Kali bei der Siedhitze mit Schwefel gesättigt wird. Der Schwefel wird hier durch Vermittelung des Kali im Wasser aufgelöst; und das ganze Gemisch ist ein Salz, welches einen starken

ekelhaften Geschmack hat, aber im ganz trocknen Zustande geruchlos ist.

Der gemeine Name für dieses Gemisch ist: *Schwefelleber* (*Hepar sulphuris*).

§. 326. b.

Wenn geschwefeltes Kali in Wasser aufgelöst oder nur mit Wasser befeuchtet wird, so entbindet sich geschwefeltes Wasserstoffgas (§. 201), desto mehr, je höher die Temperatur ist. Das Wasser wird dabei zerlegt (§. 225), ein Theil des Schwefels zieht Oxygene an, und der entbundene Wasserstoff löset etwas von dem übrigen Schwefel auf. Dafs das Wasser dabei wirke, ist daraus klar, weil aus trockenem geschwefelten Kali auch in hoher Temperatur kein geschwefelter Wasserstoff entbunden wird.

§. 327.

Geschwefeltes Kali, mit Wasser hinlänglich befeuchtet, zerlegt die Lebensluft auch bei geringer, bei viel geringerer Temperatur, als die ist, in welcher der bloße Schwefel diese Wirkung leistet (§. 199). Diese Zerlegung erfolgt aber sehr langsam und ohne Entzündung (§. 170). Wenn befeuchtetes geschwefeltes Kali in eine mit reiner Lebensluft gefüllte Retorte geschüttet und deren

Mündung dann mit Wasser gesperrt wird, so zeigt sich diese Zerlegung deutlich, das Sperrungswasser steigt allmählig höher, und füllt endlich die ganze Höhlung der Retorte an (§. 168). Wenn eben das mit atmosphärischer Luft geschieht, so wird die Lebensluft derselben dadurch verzehrt, und das Stickgas bleibt übrig (§. 178).

§. 328.

Auch trocknes geschwefeltes Kali zerlegt die Lebensluft, wie trockner Schwefel, aber erst in höherer Temperatur. Wenn es bei hinlänglichem Zutritte von Lebensluft oder atmosphärischer Luft lange genug gelinde erhitzt wird, so verwandelt es sich endlich in schwefelsaures Kali.

§. 329.

Die Säuren sind den Kalien näher verwandt, als der Schwefel. Wenn daher eine Säure zum geschwefelten Kali kommt, so verbindet sie sich mit dem Kali zum Neutralsalze, und der Schwefel wird frei. Dies gilt sogar von der Kohlensäure, daher setzt sowohl das trockne als das in Wasser aufgelösete geschwefelte Kali an der atmosphärischen Luft (§. 148) Schwefel ab, so dass jenes auf der Oberfläche mit Schwefelstaub

beschlägt, dieses Schwefel fallen läßt. Geschieht diese Scheidung auf dem nassen Wege, so entsteht, durch Zerlegung eines Theiles des angewandten Wassers, *geschwefelter Wasserstoff* (§. 201), der zum Theil als *Gas* sich entbindet, zum Theil mit dem angewandten Wasser, (zu desto größerem, je niedriger die Temperatur ist,) und zum Theil mit dem ausgeschiedenen Schwefel sich verbindet (§. 202).

Die sogenannte *Schwefelmilch* (*Lac sulphuris*) ist ein solcher aus geschwefeltem Kali durch eine Säure niedergeschlagener Schwefel, welcher etwas geschwefelten Wasserstoff enthält.

§. 330.

Wenn eine starke Lauge von feuerbeständigem Kali mit Phosphor gekocht wird, so entbindet sich *phosphorhaltiges Wasserstoffgas* (§. 211). Das Wasser wird zerlegt, der Phosphor oxydirt sich nach und nach, es entbindet sich also Wasserstoffgas, und dieses löset, indem es sich entbindet, etwas von dem noch nicht oxydirten Phosphor auf. Das Kali wird dadurch nach und nach in phosphorsaures Kali verwandelt.

§. 331.

Feuerbeständiges Kali, Schwefel und Kohle geben, in einem gewissen Verhältniß-

se mit einander gemischt, den *Luftzünder*, *Selbstzünder* (*Pyrophorus*), eine Materie, die sich in Lebensluft von selbst entzündet, d. h. sie auch in geringer Temperatur schnell zerlegt (§. 173). Auch an der atmosphärischen Luft entzündet er sich, aber nicht so bald, und gelinder, nur mit Glimmen. In mäßig feuchter Luft erfolgt die Entzündung schneller: das Wasser scheint daher an dieser Wirkung einigen Antheil zu haben. Der Rückstand von der Verbrennung ist schwefelsaures Kali und kohlensaures Kali; daraus erhellet, daß mit dem Kali sowohl Schwefel als Kohle im Pyrophor enthalten seyn, und daß beide verbrennen. Man könnte daher diese Materie vielleicht ganz schicklich gekohlt-geschwefeltes Kali (*Kali sulphuratum carbonatum*) nennen.

Von dieser Wirkung hat der *Pyrophorus* seinen Namen, welcher soviel, als *Feuerträger* heisst. Die praktische Chemie lehret solchen Pyrophorus bereiten: das wesentliche davon sind jene drei Stoffe. Alaun und Zucker dienen am besten dazu: jener giebt seinen Schwefel, und sein feuerbeständiges Kali, dieser seine Kohle dazu her.

1. Feuerbeständiges Pflanzenkali oder Kali.

§. 332.

Das eine der feuerbeständigen Kalien nannte man bisher *Pflanzenkali* (*Kali vegetabile*), weil man es in der Asche der meisten, wenn nicht aller Pflanzen, hingegen in Mineralien gar nicht gefunden hatte. Es kann diesen Namen auch füglich noch beibehalten, obwohl izt bekannt geworden, dafs es auch in einigen Mineralien gefunden sey, weil doch im Mineralreiche dieses Kali nur selten, das Mineralkali hingegen in ungeheurer Menge, und im Pflanzenreiche dieses Kali gemein, das Mineralkali hingegen selten ist. Im reinen Zustande zeigt es sich von dem Mineralkali nicht beträchtlich verschieden, aber die Gemische, welche es mit jeder Säure zusammensetzt, sind sehr verschieden von denen, welche aus dem Mineralkali und derselben Säure bestehen.

In der neueren französischen Nomenclatur heifst dieses Kali *Potasse*. Gren hat diesen Namen in s. Nomenclatur mit latein. Endung: *Potassium*, aufgenommen. Dieser Name ist eigentlich der Name des im Handel vorkommenden unreinen Pflanzenkali, das aus gemeiner Holzasche bereitet wird, aber eben deswegen für das reine Kali nicht recht schicklich.

Klaproth hat entdeckt, daß dieses Kali auch in Mineralien, namentlich im *Leucit* oder *Leucolith* (*Beitr. zur Kenntn. der Min. Körper.* Berlin 1797, II, S. 46.) und im *Lepidolith* (*Ebend.* S. 195) als Grundstoff enthalten sey, und daher vorgeschlagen, den Namen *Kali* vorzugsweise für dieses Kali zu gebrauchen (S. 60). Neuerlich hat Jameson Leith (in Scherer's *Journal der Chemie* I, 6. S. 6, 6) die Nachricht gegeben, daß es auch im *Bimssteine* sey, und Hr. Br. Scherer hat Nachrichten vom Kali im *Zeolith*, *Basalt*, *Trapp* — beigefügt.

In der Pharmacie benennt man dieses Kali, wenn es aus der Asche gewisser Pflanzen gezogen ist, nach diesen Pflanzen; *Sal Absinthii*, *Sal Genissiae*, u. s. w. Es giebt aber nur *Ein* Kali, und wenn jene Salze sich unterscheiden, so liegen die Unterschiede in anderen Stoffen.

2. Feuerbeständiges Mineralkali oder Natrum.

§. 333.

Die andere Art der feuerbeständigen Kalien nennt man *Mineralkali* (*Kali minerale*, *Natrum*), weil es, als Mineral, (mit Säuren verbunden,) sehr häufig, hingegen in Vegetabilien ungleich seltener, als das Pflanzenkali, gefunden wird. Es ist überdem auch Grundstoff vieler thierischen Stoffe. Es unterscheidet sich von dem Pflanzenkali im rei-

nen Zustande nicht beträchtlich, aber darin, daß die Gemische, welche aus ihm und Säuren bestehen, anders beschaffen sind, als die, welche aus dem Pflanzenkali und denselben Säuren bestehen.

Das Natrum ist in der Natur als Grundstoff gewisser *Mineralien*, namentlich des *Natrum carbonicum*, des *Glauberfalzes* (*Natrum sulphuricum*), vorzüglich des *Kochsalzes* (*Natrum muriaticum*) in ungeheurer Menge vorhanden.

Die *Pflanzen*, welche in ihrer Asche statt des Pflanzenkali Natrum geben, werden unten im Abschnitte *von den Pflanzen* genannt. Es sind diejenigen, welche an den Seeküsten oder bei Salzfoolen wachsen, und daher Seewasser (d. i. Wasser mit Kochsalz) einsaugen, wo sie dann, vermöge ihrer Lebenskraft, das Kochsalz zersetzen u. s. w. Zu diesen gehört auch die Pflanze Kali (*Salsola Kali* L.), von welcher die kalischen Salze den Namen haben.

II. Flüchtiges Kali oder Ammoniak.

§. 334.

Von diesen beiden Kalien unterscheidet sich das dritte, das *flüchtige Kali* (*Kali volatile*) oder *Ammoniak* (*Ammoniacum*) durch seine große Flüchtigkeit. Es ist ein gemeiner Grundstoff der Thiere, und könnte in sofern, jenen Benennungen analog, auch *thierisches Kali* heißen, wenn nicht manche

thierische Stoffe auch Natrum enthielten. Indessen ist es auch in vielen Pflanzen, und einigen Mineralien enthalten.

§. 335.

Für sich allein ist dieses Kali, auch in den niedrigsten uns bekannten Temperaturen, immer *Gas*. Dieses Gas gehört zu denen, welche nicht athembar sind, auch das Brennen brennbarer Körper zu unterhalten nicht taugen. Es unterscheidet sich aber von dem Stickgas darin, daß es selbst brennbar ist: von dem Wasserstoffgas, mit dem es dieses gemein hat, darin, daß es ein salziges Gas ist, und daher vom Wasser verschluckt wird; von den sauren Gasarten überhaupt darin, daß es nicht die Eigenschaften einer Säure, sondern die eines Kali hat; vom kohlensauren und flusspathsauren Gas noch darin, daß es das Kalkwasser nicht trübt; von dem geschwefelten, gephosphorten und gekohlten Wasserstoffgas sowohl durch seinen eigenthümlichen starken Geruch und Geschmack, als durch Mangel der eigenthümlichen Eigenschaften, welche jene Gasarten haben. Wenn es mit einer sauren Gasart zusammenkommt, so wird es damit in verhältnißmäßiger Quantität zu einem Neutral-

salze, das sich erst als Dampf zeigt, nachher tropfbar oder fest wird.

Es ist specifisch leichter als Lebensluft, beinahe in dem Verhältniss 1:2.

§. 336.

Das *tropfbare Ammoniak* besteht aus Ammoniak und Wasser. Aus diesem entbindet sich auch in sehr geringer Temperatur immerfort Ammoniakgas; daher sein starker Geruch.

Der im gemeinen Leben sogenannte *ätzende Salmiakgeist* (*Spiritus salis ammoniaci causticus*) ist ein solches tropfbares Ammoniak.

§. 337.

Auch das flüchtige Kali hat grofse Anziehung zum Schwefel. Das *geschwefelte flüchtige Kali* (*Ammoniacum sulphuratum*) entsteht als ein sehr stark und widrig riechender Dunst, wenn Schwefel und flüchtiges Kali, beide als Dunst, mit einander zusammenkommen. Es hat starke Anziehung zum Wasser und mischt sich mit ihm völlig zu einer gelben tropfbaren Flüssigkeit, aus welcher auch in geringer Temperatur immerfort jener Dunst entbunden wird.

Man nennt dieses Gemisch im tropfbaren Zustande *flüchtige Schwefelleber*, auch *Spiritus fumans Beguini*.

Was oben von der Fällung des Schwefels durch Säuren (§. 329), und der dabei erfolgenden Entbindung des geschwefelten Wasserstoffgas gesagt ist, das gilt auch hier.

§. 337. b.

Lauge von reinem Kali, sowohl von feuerbeständigem, als von flüchtigem, verschluckt das geschwefelte Wasserstoffgas, und macht damit ein Gemisch aus, welches aus Kali, Schwefel und Wasserstoff (*Kali hydrosulphuratum*, *Hydrosulphur Kali*) in Wasser aufgelöst, besteht. Ohne Zutritt der Luft ist das Gemisch klar und farbenlos; wie aber die Luft Zutritt erhält, wird es gelb, dann allmählig trübe und setzt Schwefel ab.


S. Berthollet über das schwefelhaltige Wasserstoffgas in Scherers *Journ. der Chemie*. 1. 4. S. 369.

§. 338.


Das flüchtige Kali besteht aus *Wasserstoff* (§. 189) und *Salpeterstoff* (§. 176). Zwar ist es noch keinem Chemisten gelungen, das flüchtige Kali so in diesen beiden Stoffen zu zerlegen, oder geradezu aus ihnen zusammenzusetzen, dass dieser Satz vollkommen erwiesen wäre. Indessen stimmen sehr viele chemische Erscheinungen mit dieser Hypothese vortrefflich überein.

1. Wenn man das Gas des flüchtigen Kali durch eine glühende eiserne Röhre streichen läßt, in welcher oxydirtes Magnesium (Braunstein) liegt, so gehen salpeterhalbsaures Gas und Wasser über *).

Das letztere entsteht aus dem Oxygene des oxydirten Magnesiums und dem Hydrogene des Ammoniaks.




2. Wenn man Bleihalbsäure in einem mit Ammoniakgas gefüllten gläsernen Gefäße durch den Brennpunkt eines Brennglases erhitzt, so wird jene zu metallischem Blei hergestellt, das Ammoniakgas wird in Gas nitrogene verwandelt, und es erzeugt sich Wasser aus dem Oxygene der Bleihalbsäure mit dem Hydrogene des Ammoniaks.




3. Wenn man Zinnfeile mit schwacher Salpetersäure (d. i. Salpetersäure mit Wasser) anfeuchtet, und nach einigen Minuten
feuer-

feuerbeständiges Kali (Pottasche) zusetzt, so bemerkt man den Geruch von Ammoniak.



4. Wenn man starkes gewässertes Ammoniak über rother Quecksilberhalbsäure oder Bleihalbsäure ††) digerirt, so verwandelt alles Ammoniak sich in Ammoniacum nitricum (flammenden Salpeter). Es erzeugt sich nämlich Salpetersäure aus dem Nitrogene des Ammoniaks und dem Oxygene der Quecksilberhalbsäure, und setzt sodann mit dem noch übrigen nicht zeretzten Ammoniak Ammoniacum nitricum zusammen.



Das Verhältniß beider Grundstoffe des Ammoniaks zu einander ist schwierig zu bestimmen, weil man nicht geradezu aus diesen beiden Materien Ammoniak zusammensetzen, noch es so in dieselben zerlegen kann, daß sich eine leichte Berechnung

ergäbe. Indessen ist nach Berthollet **) das Verhältniß des Hydrogene zum Nitrogene = 29 : 121, d. i. in Hunderttheilen

<i>Hydrogene</i>	19,34
<i>Nitrogene</i>	80,66
	100

*) Diesen Versuch hat zuerst Isaak Milner gemacht, nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Magnesiumhalbsäure für sich allein kein salpeterhalbsaures Gas giebt. *Philosoph. Transact.* Vol. 79. P. II. p. 300. *Gren's Journal der Physik.* III. S. 87.

†) Van Mons in Rozier's *obs. sur la physique* Tom. 36. S. 447. Vergl. Fourcroy in den *Annales de Chimie.* VII. p. 293. *Gren's Journal der Physf.* I. 127.

**) *Mem. de l'ac. des sc. de Paris.* 1785. p. 316. *Crell's chem. Annalen.* 1791. II. S. 169.

§. 339.

Wenn wir diese Hypothese annehmen, so dürfen wir analogisch schliessen, daß auch die *feuerbeständigen Kalien* aus Hydrogene und Nitrogene bestehen, weil sie dem flüchtigen in Rücksicht des Geschmacks, der Verbindung mit Säuren und mit Schwefel, des Fällens der Metalle — so äusserst ähnlich sind. Da sie sich aber von ihm durch ihre grofse Feuerbeständigkeit so sehr unterscheiden, obwohl beide jene Stoffe sehr flüch-

tig sind, so enthalten sie wahrscheinlich noch einen feuerbeständigen, der im flüchtigen Kali fehlt. Vielleicht ist dieser Stoff eine *Erde*: welches um so wahrscheinlicher wird, da gewisse Erden, die wir sogleich betrachten werden, völlig die Eigenschaften der feuerbeständigen Kalien zeigen; nur durch geringere Auflöslichkeit im Wasser von ihnen verschieden sind.

Dieses wird noch wahrscheinlicher, da van Mons aus ätzendem feuerbeständigem Kali und rothem (durch bloße Hitze und Luft bereiteten) Quecksilberkalke durch Destillation Wasser und Salpetersäure erhielt. Vor mehreren Jahren behauptete Osburg (*chem. Versuche über die Frage: ob mineralisches Alkali und Laugensalz als Arten oder als Varietäten unterschieden sind. Erfurt 1786.*) aus Pflanzenkali Kalkerde, aus Mineralkali Kalkerde durch Säuren ausgeschieden zu haben. Allein die genauen musterhaften Versuche des Herrn Schrader in Berlin, bei welchen er sich der Reinigung des Kali durch Kohlenensäure und silberner Tiegel bediente, haben hinlänglich gezeigt, daß aus *reinen* Kalien keine Erde ausgeschieden werde. (*Trommsdorff's Journal der Pharm. III. 2. S. 173.*)

Curaudau hat einige Versuche angestellt, welche, wenn sie gleich nicht beweisen, daß die feuerbeständigen Kalien aus *Hydrogene* und *Nitrogene* bestehen, doch mit dieser Hypothese vortreflich übereinstimmen. 1) Wenn man eine star-


ke Lauge von Kali oder Natrum in eine große Masse siedendes Oel (gleichviel welches) schüttet, so entbindet sich sogleich Ammoniak. 2) Wenn man gleiche Theile Salpeter (Kali nitricum) und Kohle mit einander verpuffen läßt, und den Rückstand (Kali carbonicum), mit Wasser zu Teig befeuchtet, in einer Retorte bis über den Siedgrad des Wassers erhitzt, so entbindet sich Ammoniak. Bei dem Natrum ist der Erfolg derselbe: aber nicht bei dem Kalk. S. Scherers *Journal der Chemie*. II. 8. Heft. S. 117.

§. 339. b.


Es wird unten, in der Betrachtung der organischen Körper gezeigt werden, daß die Kalien aus denselben durch Glühhitze bereitet werden. Daher hat man die Frage aufgeworfen, ob dieselben aus den organischen Materien erst durch das Feuer erzeugt werden, oder schon vor der Wirkung desselben auf die Körper in ihnen präexistiren? Nach dem dynamischen Systeme ist diese Frage geradezu dahin zu beantworten, daß sie nicht präexistiren, weil nach diesem kein Grundstoff eines Gemisches vor der Scheidung derselben da ist, sondern erst durch die Scheidung entsteht. Nach dem atomistischen hingegen scheint man aus gewissen Versuchen annehmen zu müssen, daß die Kalien in gewissen organischen Körpern schon vor der Wirkung

des Feuers auf die Körper, wenn gleich nur als Grundstoff, nicht frei, sondern mit Säuren oder andern Grundstoffen der Materien gemischt, in denselben existiren, weil sie auch auf dem nassen Wege durch schickliche Scheidungsmittel dargestellt werden können. Eben das gilt von Beantwortung der Frage, ob die Kalien, welche durch Fäulnis dargestellt werden, *Producte der Fäulnis* sind, oder *nicht*? Doch kann man, auch nach dem atomistischen Systeme, diese Präexistenz der Kalien vor der Verbrennung oder Fäulnis nur von einigen, nicht von allen organischen Körpern, namentlich nur von denen Arten behaupten, aus welchen man ohne Verbrennung oder Fäulnis dieselben dargestellt hat.

Marggraf (*chym. Schriften*. II. S. 49) hat gezeigt, daß man aus dem sogenannten Weinstein (Weinsalze) das Kali auf nassem Wege darstellen könne. Man setze einer gesättigten heißen Lauge desselben eine hinlängliche Menge reiner Kalkerde zu, so verbindet sich diese mit der Weinsäure und fällt, als im Wasser unauflöslich, nieder, so daß bloßes Kali in der Lauge bleibt.



Nimmt man kohlenfauren Kalk, so nimmt dieser nur die überschüssige Säure des Weinsteins weg, und es bleibt in der Lauge ein Neutralsalz (Kali tartaricum, Tartarus tartarificatus). Setzt man aber diesem Salpetersäure zu, so erhält man, weil diese Säure dem Kali näher verwandt ist, als die Weinsäure, prismatischen Salpeter (Kali nitricum).



So kann man mutatis mutandis, wie unten im Abschnitte von den Pflanzen gezeigt wird, auch zeigen, daß im *Sauerkleesalze* Kali enthalten sey. Aber nicht sowohl geht dieses von anderen vegetabilischen Materien, und daher auch nicht von solchen Pflanzensäften, welche keine wesentliche Pflanzensalze enthalten.

Wiegand (*chem. Versuche über die alkalischen Salze*. Berlin und Stettin 1781. S. 154 fgg.) schied aus Blut, Speichel, Harn, Froschlaich, Regenwürmern, Ameisen, spanischen Fliegen, u. a. thierischen Stoffen, aus Meerrettig, Rettig, Senf, Knoblauch, Zwiebeln, u. a. Vegetabilien, auf dem nassen Wege mit Hülfe der feuerbeständigen Kali Ammoniak aus.

Beides kann erst unten im Abschnitte von den Gemischen, die aus Säuren und Kalien — entstehen, und in den Abschnitten von den *vegetabilischen* und *thierischen* Stoffen deutlich werden.

Zwölftes Kapitel.

Die Erden.

§. 340.

Alle die Materien, welche man Erden nennt, haben es mit einander gemein, sehr *strengflüssig* zu seyn. Sie erscheinen uns daher nicht allein in der gewöhnlichen Temperatur, sondern in viel höheren Wärmegraden, als *feste* Körper. Dies unterscheidet sie, zwar nur relativ, von den Salzen, aber doch so viel, daß die strengflüssigsten Salze, feuerbeständiges Kali, Glaubersalz, Kochsalz, bei weitem leichtflüssiger, als alle Erden sind. Vollends unterscheidet es sie von dem sehr leichtflüssigen Eise. Mit schicklichen Flüssen (§. 125) können sie jedoch alle geschmolzen werden, und einige Erden schmelzen auch mit anderen Erden viel leichter, als für sich allein.

Hingegen hat die *Kohle* mit den Erden die Strengflüssigkeit gemein, da sie sogar in unseren Hitzgraden unschmelzbar ist.

§. 341.

Alle Erden sind auch höchst *feuerbeständig*; bleiben auch in den höchsten uns

bekannten Hitzgraden fest, oder werden höchstens tropfbar flüssig. Auch das unterscheidet sie von dem sehr flüchtigen Wasser, und von dem weissen Arsenik, der sonst wie eine Erde ausieht, auch von den meisten Salzen, die schon in geringer Hitze zu Dunst oder Gas werden, obwohl einige Salze, wie die Phosphorsäure, die Boraxsäure, das Kali und Natrum, auch in hohem Grade feuerbeständig sind.

§. 342.

Alle Erden haben mit einander den *Mangel der Brennbarkeit* (§. 186. 165) gemein. Sie zerlegen die Lebensluft weder in höherer noch in niedrigerer Temperatur, und können, sowohl in Lebensluft, als in atmosphärischer Luft, bis zum stärksten Weissglühen erhitzt werden, ohne dass dadurch die mindeste Spur der Veränderung bewirkt würde, welche man Brennen nennt. Da sie dieses mit den vollkommenen Metalloxyden gemein haben, denen sie auch im äußern Ansehen ähnlich sind, so haben einige sie für Metalloxyden gehalten. Allein man hat bis jetzt noch keine Erde durch die Mittel, durch welche Metalloxyde zu Metallen hergestellt werden, zu Metall machen können.

Es schien zwar bei den bekannten Tondy- und Ruprechtischen Versuchen, daß die Erden zu Metallen hergestellt seyen, allein es wurde durch Westrumb, Klaproth u. a. hinlänglich erwiesen, daß die vermeinten aus den Erden erhaltenen Metalle *Eisen* seyen, welches in den Tiegeln, (deren Thon eisenhaltig ist,) oder aus der zur Herstellung angewandten Kohle enthalten gewesen und durch die angewandte Beinafche *phosphorhaltig* geworden war. S. Westrumb Geschichte der neuentdeckten *Metallisirung der einfachen Erden*. Hannover 1791. 8. Goettlings *Taschenb. für Scheidekünstler*. 1791. S. 161. Klaproth in *Crells chem. Ann.* 1791. S. 119, 490. So ist auch die Reduction der Zirkonerde nicht bestätigt. S. Trommsdorf in *Scherers chem. Journ.* I. 3. S. 332.

Neuerlich hat jedoch von Humboldt berichtet, daß die Erden die Lebensluft, so auch die atmosphärische Luft, vermindern, indem sie aus dieser, das Oxygene anziehen, und das Stickgas übrig lassen sollen. Sie müssen dazu mit destillirtem Wasser befeuchtet seyn: am stärksten habe diese Eigenschaft die Thonerde, dann die Schwererde, schwächer die Kalkerde; die Kiesel- und Talkerde scheinen dieselbe nicht zu haben. S. Gilbert's *Annalen der Physik*. I. 4. S. 501.

§. 343.

Im reinen Zustande sind alle Erden *weiss*. Farbige oder schwarze Erden und Steine haben ihre Farbe oder Schwärze von Metall-oxyden (meist von Eisen,) oder von Kohlen-

stoffe, die mit ihnen vermischt oder vermengt sind. Sie haben dieses aber mit dem Eise, den Mittelsalzen und vielen Metalloxyden gemein.

So haben z. B. der Rubin, der Sapphir, der Lasurstein, — ihre Farbe vom Eisen; der Dioptas vom Kupfer; der violette Kalkspath vom Braunstein; der Chrysopras vom Nickel; der schwarze Alaunschiefer seine Schwärze vom Kohlenstoff.

§. 344.

Sind die Erden für sich, (d. h. ohne Vermittelung anderer Stoffe,) *unauflöslich im Wasser*? Wenn man dieses geradezu von allen Erden behaupten dürfte, so hätte man daran eine treffliche Gränzlinie zwischen ihnen und den Salzen (§. 239). Allein die Kalkerde, die Schwererde und die Strontionerde sind vollkommen auflöslich im Wasser; man muß daher diese, sowohl zu den Salzen, als zu den Erden zählen und vermischt eine vollkommene natürliche Gränzlinie zwischen den Erden und Salzen, man müßte denn diese Stoffe aus der Zahl der Erden ausschliessen wollen, welches doch ihre übrigen Eigenschaften nicht gestatten.

Vergl. §. 239.

§. 345.

Obwohl wir die Erden in der Natur, die außerordentlichen Wirkungen feuerspeiender Berge ausgenommen, immer im festen Zustande finden, so ist doch auch in diesem Zustande ihre Dichtigkeit oder specifisches Gewicht, selbst bei einer und derselben Erdart sehr verschieden. Indessen sind die schwersten Erden, Schwererde und Strontionerde, höchstens 4 bis 5,000 schwer, also leichter als das leichteste der bekannten Metalle, Tellurium (6,115). Aber, jedes Metalloxyd ist specifisch leichter, als sein Metall; der Unterschied zwischen der specifischen Schwere der leichteren Metalloxyden und der schwereren Erden ist daher nicht so groß, und es ist die Frage, ob nicht die leichtesten Metalloxyden, z. B. die sogenannten Zinkblumen, specifisch leichter, als die Schwererde, sind. Man möchte also, da ohnehin dieser Unterschied nur relativ ist, daher keinen Beweis für den Satz nehmen können, daß die Erden reine Metalloxyden seyn.

§. 346.

Noch ein Charakter der Erden, welcher sie von den Metallen besser unterschei-

det, ist der, daß sie aus ihren Auflösungen in Säuren durch reine *Blutlauge* nicht gefällt werden. Dies gilt allerdings auch von der Schwererde; wenn die Blutlauge aus der Auflösung derselben in reiner Salpeter-Salz- oder Essigsäure einen weissen Niederschlag fället, so rührt dieses von der Schwefelsäure her, welche entweder mit dem Kali der Blutlauge verbunden war, oder hinzugekommen ist, indem man sie auf die Klaprothische Weise gereinigt, und nicht sorgfältig genug das entstandene Kali vegetabile sulphuricum abgetrennt hat.

Indessen werden freilich auch nicht *alle* Metalle durch Blutlauge gefällt. S. unten *Gold*, *Platina*, *Spießsglanzmetall*, *Tellurium*.

Merkwürdig ist hier, was Klaproth (*Beitr. zur Kenntniß der Mineralkörper* I. Posen und Berlin 1795. S. 224) und Guyton (*Annales de Chimie*. XXI. p. 72.) zuerst an der Zirkonerde, nachher Reineke (*Crell's chem. Annalen*. 1798. II. S. 365) auch an der Thonerde, beobachtet haben, daß, wenn sie mit Eisenoxyd in einer Säure aufgelöst sind, das blaure Kali nicht allein das Eisenoxyd als Berlinerblau, sondern auch die Erde als blaure Erde fälle.

§. 347.

Der Unterschied im Zusammenhange, nach welchem man im gemeinen Leben *Er-*

den und Steine unterscheidet, ist kein chemischer Unterschied. Eine und dieselbe Erde kann als eigentlich sogenannte Erde oder als Stein gefunden werden, je nachdem die Art ihrer Zusammenhäufung ist.

1.

Die Kiesel Erde.

§. 348.

Die *Kiesel Erde* (*Terra silicea*) hat alle oben genannten allgemeinen Eigenschaften der Erden. Sie ist insbesondere so strengflüssig, daß sie nur in äußerst hohen Hitzgraden schmilzt, ja es ist noch die Frage, ob das von ganz reiner Kiesel Erde gelte?

Ehrmann hat zwar mit Hülfe der Lebensluft *Bergkry stall* geschmolzen, welcher größtentheils aus Kiesel Erde besteht: er hält jedoch etwas weniger Thonerde und Kalkerde. (*Schmelzkunst mit Beihülfe der Feuerluft*. Strasb. 1786. S. 212.)

Im Feuer des Porcellanofens schmilzt Quarz nicht, weder im Thontiegel, noch im Kohlentiegel. Klaproth *Beitr. zur Kenntn. der Min.* I. S. 25.

§. 349.

Sie unterscheidet sich von den anderen Erden darin, daß sie in Säuren, zumal auf dem nassen Wege, *unauflöslich* ist. Von die-

ser Regel macht jedoch die *Flusssäure* eine Ausnahme, welche als Gas die Kiesel-erde auflöst, und mit sich dermassen verflüchtigt, dass diese, für sich höchst feuerbeständige, Erde mit ihr zu Gas wird. Auch die gewässerte Flusssäure löset Kiesel-erde auf, allein viel weniger: daher setzt das mit Kiesel-erde erfüllte flusssäure Gas, wenn es in Wasser tritt und von ihm verschluckt wird, eine beträchtliche Kieselrinde ab. Auch die Boraxsäure und Phosphorsäure scheinen Kiesel-erde, jedoch nur auf dem trocknen Wege aufzulösen, wenn sie in glühendem Flusse mit ihr in Berührung sind: wenigstens greifen sie im glühenden Flusse die thönernen Tiegel an, und lassen nachher bei der Auflösung in Wasser Kiesel-erde fallen.

Wenn die Kiesel-erde mit Thonerde innig verbunden ist, so scheint sie dennoch in verdünnter Schwefelsäure auflöslich zu seyn. Sie setzt sich aber bei der Abdampfung wieder daraus ab. Klaproth Unterf. der Alaunerde von Chemnitz in *f. Beitr. zur Kenntn. der Min. K. I. S. 258.*

§. 350.

Hingegen wird die Kiesel-erde von *feuerbeständigem Kali* aufgelöst, sowohl auf dem nassen, als auf dem trocknen Wege, auf dem letzteren aber in viel grösserer

Quantität. Sie schmilzt mit demselben in der Glüehitze vollkommen zusammen: drei Theile trocknes Kali lösen völlig vier Theile, ja bei grofser Weifsglüehitze noch mehr reine Kiefelerde auf; bei diesem Verhältnisse, wo das Kali viel weniger, als die Kiefelerde beträgt, entsteht ein Gemisch, welches eigentlich *Glas* (*Vitrum*) heifst. Dieses ist sehr strengflüssig, erfordert starke Weifsglüehitze zum Schmelzen, ist daher in geringerer Glüehitze nur weich und zäh, in der gemeinen Temperatur aber ganz fest. Es ist sehr feuerbeständig, fast so sehr, als die blofse Kiefelerde, und erträgt die stärkste Weifsglüehitze, ohne Spur von Verflüchtigung. Auch ist es unauflöslich im Wasser und auf dem nassen Wege in allen den Säuren, in welchen die Kiefelerde nicht auflöslich ist; wenigstens gilt dieses von der gemeinen Temperatur, und kurzdaurender Wirkung: wenn hingegen Wasser mehrere Tage darin siedet, so dafs durch Bedeckung die Hitze verstärkt wird, (wie bei dem Destillationsapparate,) so wird allerdings das Glas ein wenig angegriffen, etwas wenig Kali und damit auch ein wenig Kiefelerde aufgelöst. Im festen Zustande ist es so hart, dafs es nur von wohl gehärteten

stählernen Feilen und von sehr harten Steinen geritzt wird; es ist dann zugleich so spröde, daß es wenig Biegung verträgt, und obwohl es bei sehr langsamer Erhitzung endlich geglühet werden kann, ohne seinen Zusammenhang zu verlieren, so bekommt es doch bei schneller Abwechslung von Hitze und Kälte alsobald Risse. Seine Bruchflächen sind vollkommen glatt und glänzend (glasigter Bruch). Uebrigens ist reines Glas, d. h. solches, welches aus reiner Kiefelerde und reinem Kali besteht, vollkommen farbenlos: und Farbe in demselben rührt immer von anderen Stoffen her.

§. 351.

Je größer in dem Gemische der Kiefelerde und des Kali die Quantität des letzteren ist, desto leichtflüssiger ist es nicht allein in der Glühehitze, sondern desto auflöslicher auch im Wasser und in Säuren. Wenn 1 Theil Kiefelerde mit 4 Theile Kali zusammengeschmolzen wird, so entsteht ein weißes festes Gemisch, das vollkommen im Wasser auflöslich ist, ja schon an der Luft in wenigen Tagen zerfließt, und dabei um das Zwiefache schwerer wird (§. 254).

So hat das gemeine grüne Glas seine Farbe vom Eisen im gemeinen Sande und der gemeinen Asche.

Auch andere geschmolzene und wieder erhärtete Massen heißen *Gläser*, wenn sie dem eigentlichen Glase ähnlich sind. Zum Unterschiede heißt dann dieses: *Kieselglas* (*Vitrum siliceum*).

§. 351. b.

Die aus wenigem Wasser und diesem Gemisch bestehende Lauge heißt *Kieselfeuchtigkeit* (*liquor silicum*), weil sie wirklich Kieselerde, nämlich durch Vermittelung des Kali, aufgelöst enthält. Die Säuren sind dem Kali auf dem nassen Wege näher verwandt, als die Kieselerde; wenn daher der Kieselfeuchtigkeit irgend eine Säure zugesetzt wird, so zeigt sich augenblicklich Kieselerde in lockeren Flocken, die allmählig zu Boden sinken. Wenn des Wassers wenig ist, so gerinnt das ganze Gemisch in einen dicken Klumpen.

Eigentlich heißt nur das *Kieselfeuchtigkeit*, was aus dem mit der Kieselerde geschmolzenen Kali durch Zerfließung an der Luft entsteht. Man pflegt aber auch die künstlich bereitete Lauge so zu nennen, wenn man zu dem Gemisch nicht mehr als 2 oder 3 mal so viel Wasser genommen hat.

§. 352.

Es ist merkwürdig, dafs, wenn die Kiefelfeuchtigkeit mit sehr viel Wasser (20 und mehr Theilen) verdünnt wird, dann das Kali derselben mit Säure übersättigt werden kann, ohne Kiefelerde fallen zu lassen. Ist die Kiefelerde zwar chemisch vom Kali getrennt, aber äufferst fein zertheilt im Wasser schwebend, so dafs ihre Theilchen nur unter zu kleinen Sehewinkeln erscheinen, um von uns gesehen werden zu können?

§. 353.

Wenn kohlenfaures Kali mit Kiefelerde zusammengeschmolzen wird, so geht die Kohlenfäure als Gas heraus, indem das Kali sich mit der Kiefelerde vermischt. Dieses widerspricht dem Verwandtschaftsgesetze (§. 351) nicht, weil hier, auf dem trocknen Wege und in der Glühehitze, die Flüchtigkeit (d. h. die Neigung, Gas zu seyn) der Kohlenfäure wirkt. Dasselbe findet man bei dem Salpeter (Kali nitricum), dessen Säure sich als Dunst entbindet, indem sein Kali mit Kiefelerde zusammenschmilzt.

§. 354.

Ob die Kiefelerde im *Wasser* auflöslich sey, (§. 344), ist noch zweifelhaft. Reine,

aus Kiefelfeuchtigkeit gefällt, wohl ausgewaschene, Kiefelerde löset sich freylich in Wasser, auch durch langes Kochen, nicht auf. Allein man hat in dem natürlich heißen Wasser des Geysers und andrer Quellen auf Island Kiefelerde aufgelöset gefunden, und obwohl in hundert Würfelzollen des Wassers der Quelle zu Reikum neben 9 Granen Kiefelerde auch 3 Gran kohlenfaures Natrum enthalten sind, so scheint doch dieses nach Klaproth nicht Verbindungsmittel seyn zu können, erstlich weil seine Quantität zu klein, und zweitens weil er mit Kohlensäure begabt ist. Allein es ist die Frage, ob nicht das Natrum der 5 Gran Glaubersalz, und der 8,5 Gran Kochsalz, welche Klaproth in dem genannten Quantum dieses Wassers fand, vorher als Natrum, ohne Säure, mit der Kiefelerde verbunden waren, und sie im Wasser auflöslich machten, dann erst die Säuren hinzukamen, und nun die Kiefelerde in dem Wasser äußerst locker und fein zertheilt schwimmend blieb, eben wie wir es bei der Kiefelfeuchtigkeit sehen, wenn wir diese mit vielem Wasser verdünnen, und dann mit Säure übersättigen (§. 352):

Eben diese war auch Black's Meinung (*de la Metherie obs. sur la physique* XLIII. p. 457. Ueb. in Gren's *n. Journal der Phys.* III. 1. S. 41.) Vergl. dagegen Klaproth's *Beitr. zur Kenntniss der Mineral-Körper.* II. S. 99.

§. 354. b.

Das *specifische Gewicht* der Kiefelerde ist im reinsten Bergkrystalle 2,653.

S. über die Kiefelerde im allgemeinen Torb. Bergman *de terra silicea.* In *opusc. phys. chem.* II. p. 26.

2.

Die Thonerde.

§. 355.

Die Thonerde (*terra argillacea, Argilla*), oder Alaunerde (*Terra aluminis*) und alle folgende Erden unterscheiden sich darin von der Kiefelerde, dass sie mit allen Säuren, und zwar auf dem nassen Wege mischbar sind. Die Thonerde zeichnet sich unter diesen insbesondere dadurch aus, dass sie mit der Schwefelsäure übersättigt (und einer kleinen Quantität Kali) verbunden Alaun zusammensetzt.

§. 356.

Sie ist äusserst strengflüssig, so sehr, dass sie nur in äusserst starker und lange wirken-

der Hitze mit Hülfe der Lebensluft schmilzt. Auch mit Kiefelerde vermischet, ist sie äußerst strengflüssig, doch schmilzt sie mit dieser durch Lebensluft leichter.

So bei *Ehrmanns* Versuchen (*Schmelzkunst*. S. 198.)

Welches heftige Feuer die Thonerde, auch in Verbindung mit der Kiefelerde, aushalte, zeigt die *Bereitung des Porcellans*.

§. 357.

Sie ist unauflöslich im *Wasser*, wird auch durch Ausglühen nicht auflöslich darin. Aber sie hat dennoch grosse Anziehung zum Wasser, so dafs sie sich mit demselben innig befeuchten und zu einer zähen Masse verbinden läfst. Je stärker sie erhitzt wird, desto mehr erhärtet sie, und desto mehr verliert sie die Eigenschaft, sich mit Wasser so innig befeuchten zu lassen. Aber sie wird durch das stärkste Ausglühen weder ätzend, noch auflöslich im Wasser.

Wenn die Thonerde allein, oder so, wie sie im Thon ist, mit lockerer Kiefelerde verbunden, mit Wasser zu einem Teige geknetet, getrocknet und der Glühehitze ausgesetzt wird, so schwindet sie sehr, und zieht sich in einen viel kleineren Raum zusammen, so dafs die ganze Thonmasse in mehrere kleine Stückchen zerreißt. Wenn sie aber bei der Vermengung mit Wasser zugleich mit dichter Kiefelerde, (Sand, gebrann-

tem Thon,) vermengt wird, so geschieht dieses Schwinden nicht. Die lockeren Thontheilchen werden dann, indem jedes in seinem Umfange mit Sandtheilchen zusammenhängt, an einander gehalten.

§. 358.

Im *feuerbeständigen Kali* ist sie auf dem trocknen Wege viel minder auflöslich, als die Kiefelerde. Reine Thonerde schmilzt mit Kali nicht zusammen: nur solche, die mit Kiefelerde oder Kalkerde verbunden ist. Hingegen löset die Thonerde, zumal frisch aus Alaun gefällte, noch feuchte, sich in starker Lauge von feuerbeständigem Kali in grosser Quantität auf, und giebt durch Abdampfen rhomboidalische Krystalle. Dies unterscheidet sie von der Kalkerde und Talkerde. Auch wenn sie mit Kali geglühet war, löset sie sich bei der Auflösung mit Kali in Wasser mit auf. *Die Säuren sind dem Kali näher verwandt, als die Thonerde; sie fällen daher diese Erde aus dem Kali.*

§. 359.

Die Thonerde scheint zum *Schwefel* keine Verwandtschaft zu haben, so wenig als die Kiefelerde. Beide Erden vereinigen sich mit dem Schwefel weder auf dem trocknen noch auf dem nassen Wege.

§. 359. b.

Das *specifische Gewicht* der Thonerde ist in der reinen Thonerde von Halle 1,669, hingegen im Sapphir 3,950.

Dass eine und dieselbe Erdart in sehr verschiedener Dichtigkeit erscheinen könne, wie vorzüglich dieses Exempel zeigt, ist schon oben (§. 345) angeführt.

§. 360.

Es ist sehr merkwürdig, dass die von der *Kieselerde* so sehr verschiedene *Thonerde* in der Natur mit derselben so häufig, und unter so mancherlei Gestalten, *vereinigt* angetroffen wird. Fast alle die Steine, welche in der Mineralogie Kieselsteine und Thonsteine heißen, bestehen aus beiden Erden gemengt oder gemischt.

- 1) Diejenigen, welche man nach einer alten Observanz *Kieselsteine* nennt, sind härter, so hart, dass sie in Glas ritzen und am Stahl Feuer schlagen.
- 2) Diejenigen hingegen, welche man nach einer alten Observanz *Thonsteine*, oder, wenn sie sehr mürb und zerreiblich sind, *Thonerden* nennt, sind mürber, so dass sie nicht in Glas ritzen, auch nicht am Stahl Feuer schlagen. Sie zeigen dabei,

vorzüglich der eigentlich sogenannte Thon, die Eigenschaften, welche die bloße aus Alaun niedergeschlagene Thonerde zeigt, mehr oder weniger; d. h. sie lassen sich leicht zerreiben, innig mit Wasser befeuchten, und damit zu einem Teige vermengen, welcher sich leicht in allerlei Gestalten kneten und bilden läßt. Auch hängen sie an der feuchten Zunge, und geben, wenn man sie befeuchtet, einen eigenen Geruch von sich, was hingegen beide jene Steine (1) nicht thun. Wenn sie, nach inniger Befeuchtung, an der Luft wohl ausgetrocknet worden, und dann der Glühhitze übergeben werden, so erhärten sie, je stärker die Hitze war, desto mehr, und bei sehr starker Hitze werden sie auch so hart, daß sie am Stahle Feuer geben.

Dann giebt es noch andere Steine, welche ebenfalls aus Thonerde und Kiesel-erde bestehen, aber weder so hart, als die sogenannten Kieselsteine, noch so mürb, als die sogenannten Thonsteine sind.

Die neueren chemischen Untersuchungen haben gelehrt, daß nicht eben alle *Kieselsteine* größtentheils aus *Kiesel-erde*, und die *Thonsteine* (nämlich die sogenann-

ten) grösstentheils aus *Thonerde* bestehen, sondern dafs es sich bei manchen umgekehrt verhält, folglich die grofse Härte der Kieselsteine nicht der Kieselerde zuzuschreiben sey. Der *Demantspath*, ein Stein, der an Härte dem Demant nahe kommt, so dafs er Bergkrytall und andere harte Steine, selbst Edelsteine, ritzet, besteht, nach Klaproths neuester Analyse, der chinesische aus 84 Procent Thonerde mit nur 6,5 Procent Kieselerde und 7,5 Eisenoxyd, der bengalische aus 89,5 Procent Thonerde, mit nur 5,5 Kieselerde, und 1,25 Procent Eisenoxyd: der *Sapphir*, ebenfalls ein Stein von grosser Härte, hat nach der Analyse eben dieses grossen Chemikers gar keine Kieselerde, sondern 98 Procent Thonerde, 1 Eisenoxyd und 0,5 Kalkerde. Hingegen der *gemeine* äufferst mürbe *Töpferthon* enthält mehr Kieselerde als Thonerde, jene im Verhältnifs zu dieser, wie 55:45, ja theils wie 65:35. Indessen haben auch nicht alle Kieselsteine so wenig Kieselerde; es giebt einige, welche wie der *Feuerstein*, der *Quarz*, grösstentheils aus Kieselerde bestehen. Der schwarze Feuerstein, welchen Klaproth untersucht hat, enthält 98 Procent Kiesel-

erde, nur ein halbes Kalkerde, ein viertheil Procent Thonerde und ein viertheil Procent Eisenkalk. Der *Bergkrystall* nach Bergman 93 Procent Kiefelerde, 6 Procent Thon- und 1 Procent Kalkerde. Man darf also eben so wenig die groſſe Härte der Thonerde zuschreiben.

Wenn man daher die Steine nach dem vorwaltenden Grundstoffe ordnen wollte, so müſte man die gewöhnliche Eintheilung der Mineralogie ganz abschaffen und diejenige einführen, welche Gerhard in seinem vortreflichen *Grundriffe eines neuen Mineralsystemes*, Berlin 1797. aufgestellt hat.

Wir wollen die Kiefelerde, so wie sie im Thon ist, *lockere* Kiefelerde, und so wie sie in den Kieselsteinen ist, *dichte* Kiefelerde nennen. Jene nimmt an den Eigenschaften der Thonerde Antheil, so wie hingegen diese in den Kieselsteinen an den Eigenschaften der Kiefelerde Antheil nimmt.

Uebrigens kann man von den Steinen, welche wahre Gemische sind, z. E. dem Rubin und allen Edelsteinen, auch dem Bergkrystalle, nicht eigentlich sagen, daß sie aus Kiesel- und Thonerde bestehen, wenn man sich nach dem dynamischen Systeme richtig ausdrücken will, sondern man muß sagen: wenn diese Steine zerlegt werden, so entsteht Kiesel- und Thonerde (§. 99).

§. 361.

Manche Steine der ersteren Art finden wir in der Natur *krystallisirt* (§. 28); so

den Bergkryftall in fechsfeitigen Säulen mit fechsfeitigen Endspitzen, den Beryll in fechsfeitigen gestreiften und oft tief gefurchten Säulen, den ostindifchen Rubin, Sapphir und Topas in doppelten fechsfeitigen Pyramiden, den brasilifchen Rubin, Sapphir und Topas in achtfeitigen Säulen. Durch welches Menstruum die Kiefelerde in dem Bergkryftall (welcher fast ganz aus Kiefelerde besteht,) und anderen Steinen dieser Art kryftallifirt sey, ist sehr problematisch. Dafs sie mit Hülfe des feuerbeständigen Kali aufgelöset gewesen, ist fast am wahrscheinlichsten, und wird zumal durch gewisse Beobachtungen künstlicher Kryftallifation †) wahrscheinlich gemacht, obwohl wir nicht bestimmen können, wo denn das Kali, von welchem sich doch in der Nähe solcher Steine nicht die mindeste Spur findet, geblieben sey?

Eben so problematisch ist dieses im Sapphir, (der blofs Thonerde enthält,) und anderen Steinen dieser Art, die aus Thonerde und Kiefelerde bestehen, obwohl bei der Thonerde die Kryftallifation in Lauge von feuerbeständigem Kali viel leichter ist, als bei der Kiefelerde.

†) Neuerlich merkwürdig ist hier die Beobachtung des Hrn. Prof. Siegling (*Trommsdorf's Journal der Pharmacie*, II. 2. S. 76.) Er hatte die Kieselfeuchtigkeit auf die gewöhnliche Art bereitet und in einem grünen Zuckerglase, welches etwa 12 Unzen Flüssigkeit fassen konnte, mit Papier verbunden hingestellt. Diese hatte 8 Jahre ruhig gestanden, als er von ungefähr dazu kam, und eine schöne KrySTALLISATION darin bemerkte. Es waren ungefähr 2 Unzen Flüssigkeit darin, welche mit einer krySTALLINISCHEN Rinde bedeckt waren. Hr. Prof. Trommsdorf zerbrach das Glas und fand auf dem Boden KrySTALLen von Kali sulphuricum und reinem Kali, die Flüssigkeit enthielt noch aufgelöstes reines Kali und Kieselerde. Er kochte die Rinde mit Wasser aus, ein großer Theil der KrySTALLen lösete sich auf und gab nach der Verdunstung Kali carbonicum. Es blieben aber *vierseitig pyramidalische* KrySTALLen in festen zusammenhängenden Stücken zurück, die von Säuren nicht angegriffen wurden, vollkommen *durchsichtig* und so hart waren, daß sie *am Stahl Funken gaben*. Sie löseten sich in 4 Theilen schmelzenden Kali auf und gaben damit eine (im Wasser) auflösliche Glasmasse, aus der sich Kieselerde scheiden liefs: von der Flußsäure wurden sie angegriffen und eine beträchtliche Menge davon aufgelöst. Sie waren also fast vollkommene *BergkrySTALLe durch Kunst erzeugt*. Ein anderer Theil der Rinde, der weniger durchsichtig war, zerfiel bei dem Kochen mit Wasser, und blieb als Kieselerde zurück, welche so hart war, daß sie Glas ritzte.

§. 362.

Reine Kiefelerde findet man in der Natur gar nicht: am reinsten ist sie im Quarz und Feuerstein (§. 360). *Reine Thonerde* höchst selten, und bis izt nur zu Glaucha bei Halle an der Saale.

Die von Schemnitz hat 45 Thonerde und 14 Kiefelerde. Klaproth *Beitr.* I. S. 258.

§. 362. b.

Einige haben geglaubt, daß die Thonerde eine besonders modificirte Kiefelerde sey, und sich durch eine gewisse chemische Behandlung in jene verwandeln lasse. Indessen sind die vermeintlichen Erfahrungen, auf welche diese Meinung sich gründet, hinlänglich widerlegt.

Namentlich beobachtete Beaumé (*mem. sur les argiles.* Par. 1770. 8.), daß, wenn er Kiefelerde mit Kali geschmolzen in Wasser auflösete, dann mit Säure aus der Auflösung fällete, und überschüssige Säure zugab, der Niederschlag größtentheils aufgelöst wurde, und das Mittelsalz gab, welches aus Thonerde und der angewandten Säure entsteht. Allein, aus Wiegleb's (*disquis. chem. de silice* in den *nov. A. N. C.* Append. T. VI. p. 397.) und anderen neueren Untersuchungen erhellet, daß die natürlichen Kieselsteine nie aus ganz reiner Kiefelerde bestehen, sondern zugleich Thonerde enthalten: und überdem konnten die

irdenen Tiegel selbst etwas Thonerde liefern, die vom Kali mit aufgelöset wurde. Scheele (*Schwed. Abhandl.* XXXVII. S. 30. *Crell's n. Entd.* III. S. 174.) erhielt ebenfalls Alaun und Thonerde, wenn er irdene Tiegel anwandte, aber nichts davon, wenn er reine Kiesel Erde in einem *eisernen* Tiegel mit Kali schmolz; und Westrumb erhielt nie Thonerde, wenn er reine Kiesel Erde, auch wiederholt mit Kali schmolz. (*Crell's chem. Ann.* 1785. I. S. 155.)

3.

Die Talkerde.

§. 363.

Die *Talkerde* (*Terra talcosa*, *Magnesia*) oder *Bittersalzerde* ist mischbar mit allen Säuren und setzt mit Schwefelsäure Bittersalz, ein im Wasser sehr leicht auflösliches Salz, zusammen. Jenes unterscheidet sie von der Kiesel Erde, dieses von den übrigen Erden.

§. 364.

Sie ist unauflöslich im *Wasser*, und wird auch durch das stärkste Ausglühen nicht auflöslich darin. Eben so wenig wird sie durch Ausglühen ätzend: auch erhitzt sie sich nicht mit Wasser, nachdem sie ausgeglühet ist. Dieses unterscheidet sie von der Talkerde vollkommen. Auch macht sie, im

nicht ausgeglüheten Zustande, mit Wasser keinen zähen Teig, wie die Thonerde.

§. 365.

Sie ist eben so *strengflüssig*, als die Thonerde und schmilzt kaum in der durch Lebensluft angefachten Hitze. Auch mit Thon - und Kiefelerde ist sie eben so strengflüssig, wie die Kalkerde.

S. Ehrmanns *Schmelzkunst* S. 188.

§. 366.

Sie ist im *feuerbeständigen Kali* auf dem nassen Wege nicht auflöslich, auch auf dem trocknen kaum; doch vereinigt sie sich mit Kieselglase in der Weißglühehitze zu einer porcellanartigen harten Masse.

Dass die Talkerde weder auf dem nassen, noch auf dem trocknen Wege im Kali aufgelöst werde, hat Rose durch sorgfältige und genaue Versuche gezeigt. (Crells *chem. Annal.* 1794. I. S. 401.)

§. 367.

Die Talkerde kann zwar nicht so, wie Kalien und Kalk, mit *Schwefel* sich mischen, doch wird sie in Wasser aufgelöst, das mit geschwefeltem Wasserstoffe geschwängert ist, und mischt sich auf diese Weise mit dem darin enthaltenen Schwefel.

S. Berthollet in Scherer's *Journ. der Chem.* I. 4. S. 370.

Vergl. auch Bergman's Erfahrung in dess. *opusc.* I. p. 391. nach welcher Talkerde mit Schwefel vermengt in kleiner Quantität im Wasser sich auflösen soll.

§. 368.

Man findet diese Erde in der Natur nicht rein; mit Kalkerde und Kohlenensäure ist sie Grundstoff des *Talkspaths* oder *Bitterspaths* (der jedoch auch Kalkerde enthält,) durch Kohlenensäure oder Schwefelsäure ist sie in einigen *Wässern* aufgelöst. Uebrigens ist sie ein Grundstoff der *talkartigen Steine*, in denen sie mit anderen Erden, Thonerde, Kieselerde, Kalkerde, enthalten ist. Auch in einigen Kieselsteinen ist sie in kleiner Quantität enthalten.

Den Unterschied dieser Erde von der Kalkerde haben zuerst Black (*exp. upon magnesia alba* in den *essays and obs. read before a soc. in Edinb.* II. p. 157.) und Marggraf (*chym. Schriften.* II. S. 1. 11. 20. 32.) gezeigt. S. außerdem Torb. Bergman's vortrefl. Schrift *de magnesia.* In *opusc. phys. chem.* I. p. 365.

4.

Die Kalkerde.

§. 369.

Die *Kalkerde* (*Terra calcarea, Calx,*) ist mischbar mit allen Säuren und setzt mit
Schwe-

Schwefelsäure Gyps, ein im Wasser sehr schwerauflösliches Salz, zusammen. Jenes unterscheidet sie von der Kieselerde, dieses von den übrigen Erden.

§. 370.

Was aber die Kalkerde vorzüglich auszeichnet, das ist die Veränderung, welche die mit Kohlenensäure begabte (*Calx carbonica*) durch die *Glühehitze* erleidet. Sie verliert nicht allein das Wasser, welches in diesem Zustande mehr oder weniger mit ihr verbunden ist, und in der Glühehitze zu Dunst wird, sondern auch ihre Kohlenensäure, welche sich als Gas aus ihr entbindet (§. 141); sie wird ätzend (§. 241) und auflöslich im Wasser. Ein Theil von vollkommen ausgeglüheter, durch Ausglühen des Wassers und der Kohlenensäure völlig beraubter Kalkerde, welche man gemeiniglich *gebrannten, lebendigen, ungelöschten Kalk* (*Calx usta, viva*) nennt, erfordert in der mittleren Temperatur 680 Theile Wasser, um aufgelöst zu werden. Die Auflösung, welche *Kalkwasser* (*aqua calcis*) heißt, ist farbenlos, hat einen kalischen Geschmack, wirkt auf die oben (§. 522) genannten Pflanzenfarben, wie eine kalische Lauge. Die Kalkerde wird also durch das

Ausglühen vollkommen salzartig (§. 239), und hindert uns, zwischen Erden und Salzen eine Gränzlinie zu ziehen (ebend.)

Die Kalkerde krySTALLISIRT sich im Kalkwasser nicht, wenn man auch das Kalkwasser in der Siedhitze sättigt, und dann kalt werden läßt. Witt in Trommsdorff's *Journ. der Pharm.* V. 1. S. 155.

§. 371.

Wenn man wenig Wasser auf viel ge-
glüheten Kalk gießt, der schon völlig er-
kaltet, aber noch frisch ist, so zieht der
Kalk dieses begierig an und es wird mit ihm
fest. Darauf wird der Kalk allmählig *heiß*,
endlich, wenn die Menge groß genug ist,
so heiß als siedendes Wasser: dabei zerfällt
er zu einem sehr feinen Staube (*Staubkalk*,
Mehlkalk). Hat man etwas mehr Wasser zu-
gegossen, so entsteht ein feuchter Brei. Man
nennt dieses, den *Kalk löschen*. Die Erhit-
zung dabei rührt daher, daß das Wasser,
mit welchem man den Kalk begießt, ganz
oder zum Theile mit dem Kalke fest wird,
und daher eine geringere Capacität erhält
(§. 140).

Daß die atmosphärische Luft an dieser Erhitzung
keinen Antheil habe, zeigt die Löschung im luft-
leeren Raume der Luftpumpe.

§. 372.

Der gebrannte Kalk zerfällt, der atmosphärischen Luft ausgesetzt, nach und nach von selbst, bekommt anfangs Risse und zerfällt endlich zu Staubkalk. Dies geschieht vermöge der Wasserdünste in der Luft (§. 237). Die Erwärmung dabei ist unmerklich, weil die Veränderung zu langsam erfolgt.

S. unten *Calx carbonica*.

§. 373.

Da die ausgeglühete Kalkerde sich wie ein kalisches Salz verhält, und mit hinlänglichem Wasser tropfbarflüssig gemacht werden kann, so sollte man vermuthen, daß sie auch schmelzbarer seyn müßte, als die vorhin genannten Erden, welche durch Ausglühen nicht salzartig werden. Allein es verhält sich gerade umgekehrt: sie ist die *strengflüssigste* unter allen bekannten Erden und schmilzt nicht allein nicht im heftigsten Ofenfeuer, sondern nicht einmal mit Hülfe der Lebensluft.

S. Ehrmanns *Schmelzkunst* §. 204. 205.

§. 374.

Um so mehr ist es zu verwundern, daß sie mit *Thonerde*, welche doch fast eben so strengflüssig ist, in starkem Ofenfeuer zusam-

*mens*schmilzt. Mit Kiesel-erde allein schmilzt sie nicht: aber sie schmilzt mit Kiesel-erde und Thonerde, mit Talkerde und Kiesel-erde, mit Talkerde und Thonerde, mit Kiesel-erde, Thonerde und Talkerde zusammen.

Es ist bei diesen Gemengen und Gemischen noch merkwürdiger, daß sie leichtflüssiger sind, wenn die Kalkerde vorschlägt: z. B. 3 Theile Kalkerde mit 1 Theil Thonerde schmelzen viel leichter, als 2 Theile Kalkerde mit 1 Theil Thonerde; noch schwerer schmilzt gleichviel von beiden. Achar d *phys. chem. Abh.* S. 383. 440. 441. Doch darf auch die Thonerde nicht zu wenig betragen: 8 Theile Kalkerde und 1 Theil Thonerde schmolzen selbst mit Hülfe der Lebensluft nicht. Ehrmann S. 180. Auch mit Talkerde schmilzt sie nach Achar d. S. 441. Doch schmolz bei Klaproth's Versuchen der Bitterspath (Kalk- und Talkerde) nicht. *Beiträge zur Kenntn. der Min.* I. S. 10.

§. 374. b.

Die Kalkerde und Kiesel-erde haben auf dem nassen Wege grofse Anziehung zu einander. Wenn Kalkerde mit Kiesel-erde vermengt, dann mit Wasser befeuchtet (gelöscht) und der atmosphärischen Luft ausgesetzt wird, so erhärten und vereinigen sich beide mit einander zu einer derben steinharten Masse (*Mörtel*). Wenn reine, aus Kiesel-feuchtigkeit gefällte, und dann vollkom-

men ausgewaschene, Kieselerte in Kalkwasser geschüttet wird, so zieht sie die in ihm aufgelösete Kalkerde dermassen an sich, daß dieselbe fest wird und niederfällt.

§. 375.

Im *feuerbeständigen Kali* wird die Kalkerde auf dem nassen Wege nicht aufgelöset: auch auf dem trocknen nur mit Schwierigkeit und in kleiner Quantität. Leichter geschieht das letztere, wenn Kieselerte dabei ist.

§. 376.

Die große Aehnlichkeit der Kalkerde mit den feuerbeständigen Kalien zeigt sich auch darin, daß sie mit Schwefel sich vollkommen mischet, und damit *geschwefelten Kalk* (*Calx sulphurata*), ein Gemisch, ausmacht, welches dem geschwefelten Kali sehr ähnlich ist. Dieses Gemisch kann auf dem trocknen Wege entstehen, wenn gleichviel gebrannter Kalk und Schwefel, mit einander vermengt, mit Ausschluss der Luft, geglühet werden; auf dem nassen, wenn ein solches Gemenge mit Wasser gelöscht wird. Die oben §. 326 — 329 genannten Eigenschaften und Wirkungen zeigt auch der geschwefelte Kalk; doch ist er viel schwerauflöslicher im Wasser, als das geschwefelte Kali.

 §. 376. b.

Auch verschluckt Kalkwasser das geschwefelte Wasserstoffgas, wie kalische Lauge, so daß ein Gemisch entsteht, welches aus Kalk, Schwefel, und Wasserstoff, in Wasser aufgelöst, besteht. (*Calx hydrosulphurata*, Hydrosulphur Calcis).

§. 377.

Das feuerbeständige Kali ist dem Schwefel näher verwandt, als die Kalkerde; wenn man daher der wässrigen Auflösung des geschwefelten Kalks reines feuerbeständiges Kali zusetzt, so wird der Kalk gefällt, doch kann er sich wieder als bloßer Kalk auflösen, wenn genug Wasser da ist. Kohlenfaures Kali schlägt den Kalk als kohlenfauren Kalk nieder. — Auch aus jener Mischung (§. 376 b.) fällt feuerbeständiges Kali den Kalk.

§. 378.

Wenn gebrannter Kalk, Phosphor und Wasser mit einander gekocht werden, so entbindet sich *phosphorhaltiges Wasserstoffgas* (§. 211) mutatis mutandis, wie bei dem Kali (§. 330.)

§. 379.

Das spec. Gewicht der (kohlenfauren) Kalkerde ist als Kalkspath, Kreide, Marmor 2,251 bis 2,800. Sie ist zwar hier noch mit Kohlenfäure und Wasser verbunden: verliert sie aber diese durch das Brennen, so wird sie mit dem Verlust dieses absoluten Gewichts doch nicht dichter, und durch Schmelzung läßt sich reine Kalkerde nicht verdichten.

§. 380.

Wir finden die Kalkerde in der *Natur* nicht rein, sondern entweder mit anderen Erden, oder mit Säuren vermischt. Was man in der Natur gemeiniglich *Kalk* nennt, das ist *Kalkerde mit Kohlenfäure* gemischt. Daher kann man oben (§. 370) auch eigentlich nicht sagen, die Kalkerde erleidet diese Veränderung: sondern die mit Kohlenfäure begabte Kalkerde erleidet diese Veränderung.

5.

Die Schwererde.

§. 381.

Die *Schwererde* (*Terra ponderosa*, *Barytes*, *Baryta* Gren.) hat mit der Kalkerde sehr große Aehnlichkeit. Sie ist ebenfalls

mischbar mit allen Säuren, die mit Kohlen-
säure begabte erleidet in hinlänglich starker
Glühehitze eben die Veränderung, welche
diese Kalkerde erleidet; wird ätzend, auflös-
lich im Wasser; erhitzt sich, wenn sie mit
wenigem Wasser gelöscht wird (§. 370. 371)
u. s. w.

§. 382.

Sie unterscheidet sich aber von der Kalk-
erde erstlich durch ihr specifisches *Gewicht*,
an welchem sie die Kalkerde weit übertrifft.

So ist das spec. Gewicht des *Witherits* (*Baryta car-
bonica*) 4,271 bis 4,300, der *Calx carbonica* höch-
stens 2,800.

§. 383.

Zum andern läßt sie die Kohlen-
säure ungleich schwerer fahren, d. h. sie erfordert
viel stärkere Hitze dazu.

Die natürliche mit Kohlen-
säure begabte, der *Wi-
therit*, läßt sie noch viel schwerer fahren, als die
künstliche, mit kohlen-
saurem Kali aus Salz-
säure ge-
fällte, weil jene viel weniger Wasser hält. Wenn
man jene in einer schwach glühenden eisernen
Röhre den Wasserdämpfen aussetzt, so läßt sie
nachher ihre Kohlen-
säure viel leichter fahren. S.
Priestley in Gren's Journal der Phys. I.
S. 204.

Witherit, in einem Porcellantiegel fünf Stun-
den lang so stark geglühet, daß schon in der hal-

ben Zeit Marmor zu lebendigem Kalk wurde, hatte nichts von seiner Kohlensäure verloren, hatte auch seine Gestalt nicht verändert, nur die Durchsichtigkeit war in ein undurchsichtiges blauliches Milchweiss übergegangen. In einem gemeinen Thontiegel auf die gleiche Weise behandelt, schmolz er mit dem Tiegel zusammen und verlor 22 Procent Kohlensäure. Auch in Kohle und dann in einen Thontiegel eingeschlossen liess er sich nicht ganz seiner Kohlensäure berauben, sondern verzehrte theils die Kohle und schmolz dann mit dem Tiegel zusammen. Klaproth *Beitr. zur Kenntn. der Min.* I. S. 263. fgg. In einem Platinatiegel, der in eine Kapsel von Porcellanthon eingeschlossen, in der mittleren Feuerkammer des Porcellanofens auf 136° nach Wedgwoods Pyrometer erhitzt war, verlor er 11,75 Procent (obwohl er 22 Procent Kohlensäure hält). Klaproth II. S. 88. Pelletier mengte die Baryta carbonica mit 0,1 Kohlenstaub, und ein wenig Gummi und Wasser zu einer Kugel: diese legte er auf Kohlenstaub in einen Tiegel, und setzte denselben, nachdem er verschlossen worden, einem heftigen Feuer aus. Dadurch wurde die Kohlensäure (ganz?) ausgetrieben und die Schwererde auflöslich im Wasser. (Crell's *chem. Annal.* 1796. II. S. 302.)

§. 383. b.

Und drittens entstehen in dem mit Hülfe der Siedhitze völlig gesättigten *schwererigten Wasser* (*Aqua barytica*) bei der Abkühlung oktaëdrische Kryalle, welche hingegen im Kalkwasser nicht entstehn.

Pelletier in *Annales de Chimie*. XXI. p. 125.

Klaproth *Beitr. zur Kenntn. der Min.* II.

S. 89. Dies geschieht aber nur, wenn die Auflö-

fung genau vor der Luft verwahrt wird. Wenn die

Auflösung der Luft (nämlich der atmosphärischen)

ausgesetzt ist, so zieht sie alsobald Kohlen Säure

an, es entsteht kohlen saure Schwererde, welche

dann niederfällt. Auch die Krytalle ziehen an

der Luft Kohlen Säure an.

Nach Bergman (*de acido aëreo* §. 10.) lö-
sen 900 Theile Wasser 1 Theil Schwererde auf: er
hat aber die Temperatur nicht bestimmt.

§. 384.

Sie ist viertens zwar auch sehr streng-
flüssig, aber doch viel schmelzbarer, als die
Kalkerde, und schmilzt mit Hülfe der Le-
bensluft auf der Kohle leicht. Im Ofenfeuer
schmilzt sie für sich nicht, aber mit Thon-
erde, daher nicht im Kohlentiegel, aber im
Thontiegel. Es ist dabei sehr merkwürdig,
daß der Witherit den in einem Thontiegel
eingeschlossenen Kohlentiegel angreift und
verzehrt, und dann endlich mit dem Thon-
tiegel zusammenschmilzt.

Ehrmann *Schmelzkunst* §. 216.

Klaproth *Beitr.* II. S. 36. 269. Daß dieses
vermöge des Kupferoxyds, das der Witherit ent-
hält, geschehe, ist nicht zu glauben, da dies nicht
einmal den zehntausendsten Theil beträgt.

§. 385.

Endlich macht sie mit Schwefelsäure nicht Gyps, sondern ein im Wasser unauflösliches Gemisch aus, welches in seiner chemischen Beschaffenheit mit dem Mineral übereinkommt, das man *Schwerspath* nennt.

§. 386.

Die Schwererde mischt sich wahrscheinlich mit dem Schwefel, wie die Kalkerde (§. 376) zu *geschwefelter Schwererde* (*Baryta sulphurata*), wenn gleiche Theile gebrannte Schwererde und Schwefel mit einander vermengt, geglühet werden.

Genauer kennt man die Entstehung der *Baryta sulphurata* aus *Baryta sulphurica* (Schwerspath) und Kohle. S. unten *Baryta sulphurica*.

§. 387.

Man findet diese Erde als *Baryta sulphurica* häufig in der *Natur*; mit Kohlensäure begabt aber nur selten, und als reine Schwererde gar nicht.

S. unten *Baryta carbonica*, Witherit. Scheele hat zuerst gezeigt, daß diese Erde eine besondere, von der Kalkerde verschiedene, Erde sey. S. dess. *Abh. von Luft und Feuer*. Lpz. 1782. S. 144. — Martinenghi wollte beobachtet haben, daß in dem Schwerspath ein eigenes Metall enthalten (v. Crell *ch. Ann.* 1794. I. S. 195.) und Pelletier ver-

sicherte vor seinem Tode, er habe gefunden, daß die Schwererde metallischer Art sey (Scherer's *Journal der Ch.* II. 8. S. 230.

6.

Die Strontionerde.

§. 388.

Die neuerlich entdeckte *Strontionerde* (*Terra strontionæ*, Caledonia Forster) hat ebenfalls mit der Kalkerde Aehnlichkeit, und noch grössere mit der Schwererde. Sie ist ebenfalls mischbar mit allen Säuren; die mit Kohlenensäure begabte leidet in der Glühhitze eben die Veränderung, welche die Kalkerde und Schwererde erleiden: wird ätzend, auflöslich im Wasser, erhitzt sich, wenn sie mit wenigem Wasser gelöscht wird u. s. w. (§. 371.)

§. 389.

Sie ist specifisch *schwerer* als die meisten Erden, auch als die Kalkerde, doch leichter, als die Schwererde (§. 382).

So ist z. B. das spec. Gewicht des Strontionits nach Lichtenberg 3,591.

§. 390.

Sie läßt die Kohlenensäure in der Kalkerde viel *schwerer* fahren, als die Kalkerde, aber leichter als die Schwererde.

Strontiona carbonica (wie §. 385 angegeben worden) im Porcellantiegel geglühet, verlor 6 Procent Kohlenensäure. Im Thontiegel schmolz sie mit der Thonmasse zusammen, und verlor dabei 30 Procent. In Kohle und dann in einen Thontiegel eingeschlossen verlor sie ihre Kohlenensäure ganz (31 Procent).

§. 391.

Die mit Hülfe der Siedhitze gesättigte Auflösung dieser Erde giebt durch Abkühlung Krystalle, aber länglicht prismatische, die gemeiniglich so dünn sind, daß sie nadel förmig erscheinen, und, wie fadenartig gestrickt, zusammengehäuft sind.

§. 392.

Sie ist ebenfalls strengflüssig, und schmilzt im Ofenfeuer, für sich, im Kohlentiegel, nicht; aber im Thontiegel schmilzt sie mit dem Thon zu einer glasartigen (chrysolithgrünen) Masse zusammen.

Die Masse ist dichter, als beim Witherit. Ob die chrysolithgrüne Farbe von Eisentheilchen des Thons oder des Strontionits herrührt?


§. 393.

Sie macht mit Schwefelsäure ein Gemisch, das zwar nicht so unauflöslich im Wasser, als Baryta sulphurica, aber doch schwerauflöslicher, als Calx sulphurica (Gyps)

ist, indem es 1536 Theile siedenden Wassers zur Auflösung erfordert.

§. 394.

Von der Schwererde unterscheidet sie sich ausser den §. 389. 391. 393. angegebenen Charakteren darin, dass sie, mit Salzsäure gemischt, nadelförmige Krystalle, jene hingegen tafelförmige, giebt; dass die Baryta muriatica viel schwerauflöslicher im Wasser ist, als die Strontiona muriatica; dass eine Auflösung von dieser in nicht zu sehr entwässertem Alkohol mit karminrother, eine gleiche von jener hingegen nur mit gelblich-weisser Flamme brennt; und dass sie in der Wahlanziehung zu den Säuren der Baryta nachsteht, so dass auch, wenn Baryta acetica und Strontiona muriatica, beide im Wasser aufgelöst, zusammenkommen, aus ihnen Baryta muriatica und Strontiona acetica entstehn.



Auch ist hier noch merkwürdig, dass der Wittherit Hunden, Katzen, Caninchen, Igeln, Mäu-

len u. a. Thieren giftig ist, der Strontionit hingegen nach Blumenbachs Versuchen nicht. S. dessen *med. Biblioth.* III. 4. S. 729. Auch Pelletier in den *Annales de Chimie.* XXI. p. 120.

§. 395.

Man findet diese Erde in der Natur mit Kohlensäure begabt selten, mit Schwefelsäure in manchem Schwerspath; als reine Strontionerde gar nicht.

S. unten *Strontiona carbonica.*

Diese Erde hat ihren Namen von Strontion in Schottland, wo sie in einem Bleigange eines gneusigten Gebirgs zugleich mit Schwererde gefunden wird.

Die erste Kenntniß derselben erhielten wir durch Herrn Sulzer zu Ronneburg. S. dessen *Brief* an Herrn Hofrath Blumenbach in Voigt's Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. VII. 3 St. S. 68. Nachher haben Klaproth (*Beiträge zur Kenntniß der Min.* I. S. 260. II. S. 84. und Schmeisser (*philos. Transact.* 1794. II. p. 418. Uebers. in Gren's n. *Journal der Phys.* I. S. 135.) ihre Natur näher untersucht und bestimmt.

Meyer fand sie auch im Freiburger Schwerspath (Crell's *chem. Annalen.* 1794. II. S. 516.). Ich fand sie auch in dem weissen Schwerspath vom Harze. Lowitz fand sie in mehreren Arten Schwerpaths (*Chem. Ann.* 1795. II. S. 110.).

Die Zirkonerde.

§. 396.

Die Zirkonerde (*terra circonia*) hat es mit den vorhergenannten vier Erden gemein, mit allen Säuren mischbar zu seyn, und ist dadurch von der Kieselerde verschieden. Sie macht aber mit der Schwefelsäure weder Gyps, noch Schwerspath, noch Strontionasulphurica, noch Bittersalz, auch mit ihr und Kali keinen Alaun aus, ist also von der Kalkerde, Schwererde, Strontionerde, Talkerde und Thonerde verschieden.

Nach Klaproth (S. 214) hat die Zirkonerde zur Kohlenensäure keine Anziehung, indem, wenn sie aus Säuren durch kohlenlaures Kali gefällt worden, sie dennoch ohne Aufbrausen in Schwefelsäure wieder aufgelöst wird. Nach Vauquelin (S. 248) hingegen soll sie sogar die Kohlenensäure dem Kali entziehen, wenn Hyacinth mit diesem vermengt geglühet wird (?)

§. 397.

Sie ist sehr strengflüssig und schmilzt nicht einmal mit feuerbeständigem Kali, wodurch sie sich wieder von der Kieselerde verschieden zeigt; auch nicht mit schmelzbarem Harnsalz; doch schmilzt sie mit Borax zu einer glasartigen klaren farbenlosen Masse.

Nach

Nach Vauquelin (S. 249) schmolz reine Zirkonerde in ein ausgehöhltes Stück Kohle eingeschlossen zu einer harten Masse, die am Stahl Feuer gab.

§. 398.

Sie ist unauflöslich im *Wasser*, auch wenn sie Kohlen Säure enthalten hatte und dann bis zum gänzlichen Verlust derselben ausgeglühet war: ist also auch darin von der Kalkerde, Schwererde, und Strontionerde verschieden.

§. 399.

Sie ist in feuerbeständigem *Kali*, auch auf dem nassen Wege, unauflöslich, und dadurch von der Thonerde verschieden (§. 397).

§. 400.

Auch in dem specifischen *Gewicht* scheint sie von anderen Erden sich auszuzeichnen.

Nach Klaproth ist das spec. Gewicht des Zirkons 4,615, nach Vauquelin das der reinen in Kohle ausgeglüheten und geschmolzenen Zirkonerde 4,350. Mithin kommt sie darin ungefähr der Schwererde gleich.

§. 401.

Man findet diese Erde in der *Natur* in Verbindung mit Kieselerde und Eisenoxyd als Grundstoff des Zirkons und des *Hya-*
cinths.

Im Zirkon macht sie 69, im Hyacinth 70 Procent aus, nach Klaproth's Analyse (*Beitr. zur Kenntniss der Min.* I. S. 227.) Auch Vauquelin fand sie im französischen Hyacinth. *Annales de Chimie.* XXI. p. 72.

Wir kennen diese Erde durch Klaproth (a. O. S. 203.) Nachher hat auch Vauquelin Versuche mit ihr angestellt. *Annales de Chimie.* XVII. p. 160. Ueb. in Trommsdorff's *Journal der Pharmacie.* V. 2. S. 244.

8.

Die Glycina.

§. 402.

Endlich ist neuerdings eine Erde entdeckt worden, welche die Eigenschaft, mit Säuren süsse Salze auszumachen und daher den Namen *Süßerde* (*Glycina, Terra glycina*) erhalten hat. Sie ist höchst strengflüssig, für sich unschmelzbar, doch schmelzbar mit Borax zu durchsichtigem Glase; auch unauflöslich im Wasser. Sie ist mischbar mit allen Säuren, und unterscheidet sich dadurch von der Kiesel Erde; sie ist auflöslich in feuerbeständigen Kalien auf dem nassen Wege, wie die Thonerde, und unterscheidet sich dadurch von der Kalk - Schwer - Strontion - und Talkerde; wird, wie Thonerde, aus den Säuren, durch reines Ammoniak gefällt,

hängt auch, wie Thonerde, an der feuchten Zunge. Sie unterscheidet sich aber dadurch auch von dieser, daß sie im kohlenfauren Ammoniak, (nicht im reinen,) auflöslich ist, mit Säuren süßschmeckende Salze ausmacht, mit Schwefelsäure und Kali keinen Alaun bildet, und zu den Säuren eine nähere Verwandtschaft, als die Thonerde, hat.

Vauquelin hat diese Erde entdeckt. S. Briffon *Anf. der Naturgesch. und Chemie der Min.* mit Anmerk. von Trommsdorff, in des letzteren Nachtrage. S. 114. und Vauquelin's zwe Abhandl. über die neue Erde im Beryll, Glucine genannt, in Scherer's *Journ. der Chemie.* I. 4. S. 341. Sie hat ihren Namen von γλυκος, süß.

§. 403.

Man findet diese Erde im Beryll und peruvianischen Smaragd.

Der Beryll enthält nach Vauquelin 69 Kieselerde, 16 Glycine, 13 Thonerde, 0,5 Kalkerde, 1 Eisenoxyd; der peruvianische Smaragd 64,60 Kieselerde, 14 Thonerde, 13 Glycine, 2,56 Kalkerde, 3,50 Chromoxyd, (2 Verlust.)

* * *

Die *Demantspatherde* (*Terra corundina*), welche Klaproth im Demantspathe gefunden hatte, und anfangs für eine besondere Erde hielt, ist nach seinen neueren Untersuchungen Thonerde und keine besondere Erde. *Beitr.* I. S. 47.

Die *Australerde* (*Terra australis*, *Sidneya*, *Cambria*), welche Wedgwood im *Australfande*, der bei Sidney - Cove in Neu - Südwaless gefunden wird, entdeckt zu haben glaubte (*Phil. transact.* 1790. LXXX. p. 306. Gren's *Journ. der Physik.* IV. p. 479,) ist nach Klaproth's Untersuchungen keine besondere Erde: er fand nichts darin, als Thonerde, Kieselederde und etwas weniges Eisen. Vergl. die umständlichere Analyse von Hatchett in Scherer's *allgem. Journal der Chemie.* I. 2. S. 167. welche die gleichen Resultate liefert, nur außer jenen Stoffen auch Plumbago zeigt.

§. 404.

Alle diese hier angeführten Erden sind bis izt *unzerlegt*, und werden daher gemeiniglich *einfache* Erden genannt, obwohl sie wahrscheinlich nicht chemisch einfach sind. Da sie alle einander ähnlich, und doch wieder sehr verschieden sind, so ist vielleicht in allen ein gemeiner Grundstoff (*Terra primigenia*), mit welchem in jeder einer oder mehrere andere Stoffe gemischt sind. Dafs in der *Kalkerde* und den ihr ähnlichen Erden, welche im ausgeglüheten Zustand ätzend und im Wasser auflöslich sind (§. 370) *Salpeterstoff* und *Wasserstoff* enthalten seyn, ist aus der Aehnlichkeit (§. 3) mit den kalischen Salzen wenigstens zu vermuthen (§. 339). Dafs

die Kalkerde und Thonerde einander in Flufs bringen, ohne vorher vermifcht zu feyn, wenn fie nur gröblich mit einander vermengt find, läfst auf einen Stoff fchließen, der aus einer von beiden fich entbindet und auf die andere Erde wirkt. Ebenfo verrathen der Geruch der frifchen Kalktünche, der Geruch des Thons, wenn man ihn benetzt, gewisse flüchtige Stoffe, welche vielleicht aus den Erden fich entbinden, da diefe Gerüche doch nicht blofs aus Zerfetzung des Wassers zu erklären find. Ift vielleicht in der Kiefelerde die Terra primigenia am reinften? Das *Licht*, welches zween Kiefelfeine fowohl in atmofphärischer Luft, als in Wasser bewirken, und der Geruch, welcher dabei entfteht, wenn fie an einander gerieben werden, fcheint auf einen unbekannten, mit ihnen verbundenen, von der Kiefelerde verfchiedenen, Stoff hinzudeuten†).

In der *Natur* finden wir diefe Erden faft immer mit einander *vermifcht*; die natürlichen Erden und Steine beftehen aus zweien, dreien oder mehreren jener einfachen Erden. Diejenigen, welche blofs aus Erden beftehen, find demungeachtet *weifs*, wie der farbenlofe Bergkryftall: die meiften aber find mehr oder weniger *farbigt* oder *ſchwarz*,

von metallischen Stoffen, meist von Eisen; oder von Kohlenstoff.

S. oben §. 343.

†) Nach Schmidt's Versuchen (*Gren's neues Journ. der Phys.* I. 3. S. 319) enthalten Quarz und andere reinere Kieselsteine die Grundlage des Stickgas oder den Salpeterstoff. Sie geben bei dem Glühen mit Kali Stickgas von sich. Diesem Stoffe schreibt er auch die Entstehung des Stickgas aus Wasserdämpfen zu, welche durch glühende thönerne Röhren streichen (§. 235), indem er zeigt, daß diese Entstehung von der Kieseelerde des Thons abhängt.

§. 405.

Dann sind wieder die Erd- und Steinarten zu unterscheiden, welche durchaus *gleichstoffig gemischt* sind, wie z. B. der Kalkspath, der Quarz, der Chalcedon — (*mineralogisch einfache*); und die *gemengten* Erd- und Steinarten, welche aus verschiedenen Massen zusammengesetzt sind, wie z. B. der Granit aus Feldspath, Quarz, und Glimmer.

S. *Tabellarische Uebersicht der mineralogisch einfachen Fossilien* von Dietr. Ludw. Gustav. Karsten. Berlin 1791. fol. 1792. fol. C. Haidinger's *Entwurf einer systemat. Eintheilung der Gebirgsarten.* (1785.) 4. J. C. W. Voigt *Briefe über die Gebirgslehre.* Weimar 1786. 8. A. G. Werner *Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten.* Dresd. 1787. 4.

Nachtrag

zum ersten Hefte:

§. 216. c.

Das Hydrogene (§. 191), der Schwefel (§. 199) und der Phosphor (§. 207) verbrennen mit *Flamme*, die Kohle (§. 216) ohne *Flamme*, weil jene drei brennbaren Stoffe flüchtig sind, hingegen die Kohle feuerbeständig ist. Indem nämlich der Schwefel und der Phosphor, im Anfang der Verbrennung von außen, und nachher durch ihre eigene Verbrennung, erhitzt werden, so verdunstet jedes Theilchen derselben, ehe es verbrennt; das Hydrogene ist schon ohne Erhitzung Gas; diese Stoffe verbrennen also im Dunst- und Gaszustande, daher die Flamme (§. 156). In der Kohle aber bleibt jedes Theilchen fest, bis es verbrennt: daher kann bei ihr keine Flamme entsteht.

Kohlen, die nicht genug ausgeglühet sind, verbrennen freilich mit Flamme, es ist aber das dem Hydrogene zuzuschreiben, das in den noch nicht völlig verkohlten Theilen derselben enthalten ist. S. im ersten Hefte S. 190.

Berichtigungen.

- S. 234. Z. 5. von unten statt: *und einige* lies: oder
— 246. — 12. sollte: "*mehr*" cursiv gedruckt seyn.
— 274. — 18. lies: *es röthet die Lakmusfarbe*
(schwach oder gar) nicht
— 279. — 5. lies: zum Salpeter mehr Eisenfeile
— 288. — 17. lies: *je weniger in dieser*
— 308. — 5. von unten ist: "*übrigen*" wegzuzureichen.

§. 308. L. 2. statt: *den, welchen* lies: *das, welches.*

§. 339. b. ist durchaus statt *Körper*, *Materie* zu lesen.


Die Note S. 349. gehört nicht zu §. 351, sondern zu §. 350.

Zu §. 262. als dritte Note:

Nasses Lakmuspapier wird in kohlenfaurem Gas röthlich, verliert aber diese Röthe an der freien atmosphärischen Luft allmählig wieder, und wird wieder blau.

Zu §. 281. Note †.

Wenigstens habe ich dieses am Lakmuspapiere beobachtet. Vielleicht war der Aër porositatis Ursache? Allein warum wurde denn einiges, bei gleicher Behandlung, *nicht* roth? Ich werde dieses noch genauer untersuchen und in einem der nächsten Hefte davon Nachricht geben.



Hildebrandt, Friedrich, 1764-1816

Encyklopädie der gesammten Chemie

Bd.: 2

Erlangen 1799

Chem. 144-1/3

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10072871-6

VD18 90394054-001